

**Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου
για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία
Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια**

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης

26-27 Ιανουαρίου 2012

Τοποθεσία	:	Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα
Συμμετέχοντες	:	77

1. Στόχοι συνάντησης

Οι στόχοι της εναρκτήριας συνάντησης ήταν:

- i) η συζήτηση και ο προγραμματισμός της επίτευξης των στόχων του προγράμματος,
- ii) η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ελονοσίας και ιού του Δυτικού Νείλου από ειδικούς της Ευρώπης
- iii) η γνωριμία των συνεργαζόμενων φορέων

Το πρόγραμμα της συνάντησης δίνεται στο Παράρτημα 1.

- 2 -

2. Συμμετέχοντες

Στην εναρκτήρια συνάντηση του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία - Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» συμμετείχαν 77 άτομα. Οι 26 συμμετέχοντες προέρχονταν από τους συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος, ενώ οι 46 προέρχονταν από υπηρεσίες ή οργανισμούς με άμεση σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιατροί χωρίς σύνορα, Νοσοκομεία των περιφερειών κλπ).

Στην εναρκτήρια συνάντηση είχαν προσκληθεί πέντε ομιλητές από την Ευρώπη για να καταθέσουν την άποψη τους και να μεταδώσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους κυρίως όσον αφορά στην ελονοσία. Πιο συγκεκριμένα, οι ξένοι συμμετέχοντες ήταν οι:

- ◆ Dr Martin De Smet (Leader of the MSF Malaria Working Group, Belgium)
- ◆ Dr Philippe Gillet (Institute of Tropical Medicine, Department of Clinical Sciences, Unit of Tropical Laboratory Medicine, Belgium)
- ◆ Dr Georges Snounou (Faculty of Medicine, University of Pierre and Marie Curie)
- ◆ Dr Wim Van Bortel και Dr Herve Zeller (Office of the Chief Scientist, Emerging and vector-borne diseases, European Center for Disease Prevention and Control)

Η λίστα με τους συμμετέχοντες δίνεται στο Παράρτημα 2.

3. Πρακτικά συνάντησης

• Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

3.1 Χαιρετισμοί

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνάντησης για το «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία - Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια».

Η κα Κρεμαστινού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και κάλεσε την κα Αναστασία Πανταζοπούλου (Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) να απευθύνει χαιρετισμό.

Η κα Πανταζοπούλου χαιρέτισε τη συνάντηση και επισήμανε ότι τη Δημόσια Υγεία την απασχολεί το θέμα των λοιμωδών νοσημάτων και ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η αντιμετώπιση τους. Επίσης, επισήμανε ότι στις προτεραιότητες προστέθηκε προσφάτως και η αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας. Τόνισε ακόμη ότι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί επιτροπή τροπικών νοσημάτων που σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας είναι υπεύθυνη για τις εντομοκτονίες και τις οδηγίες προς τις εταιρείες που τις αναλαμβάνουν. Ακόμη είπε ότι πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση στο ECDC που ασχολήθηκε με το θέμα της ελονοσίας στη Λακωνία και τις πιθανές συνέπειες του στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η κα Πανταζοπούλου θέλοντας να επισημάνει τη χρησιμότητα του προγράμματος έθεσε το ερώτημα γιατί στη Γαλλία έχουν καταγραφεί κρούσματα ελονοσίας σε μετανάστες αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή σε τοπικό επίπεδο. Σε αντίθεση, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί κρούσματα ελονοσίας και στον τοπικό πληθυσμό.

Ο κ. Βακάλης καλωσόρισε τους ξένους προσκεκλημένους και τους σύστησε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια η κα Κρεμαστινού- 4 - ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι το

ΚΕΕΛΠΝΟ έχει δημιουργήσει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την ελονοσία το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Τέλος, πρόσθεσε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ θα λάβει υπόψη του τα συμπεράσματα της εναρκτήριας συνάντησης για να οριστικοποιήσει το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου παρουσίασε το πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα τους συνεργαζόμενους φορείς, τους στόχους και τις δράσεις του κάθε πακέτου εργασίας. Τέλος, τόνισε ότι η ομαδικότητα μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος (Παράρτημα 3).

3.2 Διαλέξεις από Έλληνες ομιλητές

Η κα Μπάκα παρουσίασε συνοπτικά τις επιδημίες λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 2010-2011 (Παράρτημα 4).

Ο κ. Ντάνης παρουσίασε συνοπτικά την κατάσταση σχετικά με την ελονοσία στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 2009-2011 (Παράρτημα 5).

Η κα Πολίτη παρουσίασε τα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος έναντι της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου (2010-2011) και την ελονοσία (2009-2011) στην Ελλάδα (Παράρτημα 6).

3.3 Διαλέξεις από εντομολογικές μελέτες στην Ελλάδα

Ο κ. Βακάλης προλόγισε την παρουσία στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ιδιωτικών εταιρειών που ασχολούνται με εντομολογικές μελέτες σε συνεργασία με διάφορους κρατικούς φορείς.

Ο κ. Μουρελάτος παρουσίασε την εντομολογική μελέτη που έχει κάνει για το ΚΕΕΛΠΝΟ η εταιρεία «Οικο-ανάπτυξη» για το έτος 2011 (Παράρτημα 7).

Ο κ. Περγαντάς παρουσίασε το σχέδιο_5_καταπολέμησης των κουνουπιών στην

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που ανέλαβε η εταιρεία «Βιο-εφαρμογές» για το έτος 2011 (Παράρτημα 8).

3.4 Διαλέξεις από ξένους ομιλητές

Ο Dr Wim Van Bortel παρουσίασε την εκτίμηση κινδύνου για την ελονοσία στην Ευρώπη με βάση τα στοιχεία του ECDC (Παράρτημα 9).

Ο Dr Philippe Gillet παρουσίασε τις νέες εξελίξεις σχετικά με τη διάγνωση της ελονοσίας (Παράρτημα 10). Μετά το τέλος της παρουσίασης του, πολλοί από τους συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την ευαισθησία των διαγνωστικών μεθόδων σε ασυμπτωματικά περιστατικά και αν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία. Ο Dr Gillet απάντησε ότι δεν γνωρίζει μελέτες για τη διάγνωση ασυμπτωματικών περιστατικών με τη χρήση τεστ ταχείας διάγνωσης (Rapid Diagnostic Test-RDT).. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων όσον αφορά στους ασυμπτωματικούς φορείς και ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Ο Dr Snounou παρουσίασε τις νέες εξελίξεις σχετικά με το γονοτυπικό προσδιορισμό της ελονοσίας (Παράρτημα 11) και τέλος ο Dr De Smet έκλεισε τις παρουσιάσεις με τις δυσκολίες στον έλεγχο και τη θεραπεία της ελονοσίας σε μετανάστες (Παράρτημα 12).

3.5 Ομάδες εργασίας

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες εργασίες για να συζητήσουν τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος. Οι ομάδες εργασίας ήταν οι εξής:

- **Ομάδα εργασίας 1** (συντονιστές: Ν. Παπαδόπουλος και Γ. Κολιόπουλος): Έντομα διαβιβαστές του ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας
- **Ομάδα εργασίας 2** (συντονιστές: Χ. Μπιλλίνης και Δ. Τόντης): Ιός του

- 6 -

Δυτικού Νείλου σε άγρια πτηνά, ιπποειδή και οικόσιτα πτηνά

- **Ομάδα εργασίας 3** (συντονιστές: Ν. Βακάλης και Α. Παπά): Ελονοσία και ιός του Δυτικού Νείλου – εργαστηριακά σε ανθρώπους, οροεπιδημιολογική μελέτη σε πανελλήνιο δείγμα για τον ιό του Δυτικού Νείλου
- **Ομάδα εργασίας 4** (συντονιστές: Γ. Τσελέντης και Γ. Σαρόγλου): Ελονοσία και ιός του Δυτικού Νείλου – επιτήρηση σε ανθρώπους, διάγνωση και θεραπεία ενημέρωση κλινικών ιατρών
- **Ομάδα εργασίας 5** (συντονιστές: Α. Τσακρής και Κ. Ντάνης): Ελονοσία και ιός του Δυτικού Νείλου - Screening στους μετανάστες για ελονοσία, οροεπιδημιολογική μελέτη ελονοσίας στη Λακωνία, ενημέρωση κοινού-μεταναστών για την ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου

❖ Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

3.6 Συμπεράσματα από ομάδες εργασίας

Οι ομάδες εργασίας στο τέλος της δεύτερης μέρας παρουσίασαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά τη συζήτηση των ομάδων τους. Οι ομάδες εργασίες κατέληξαν στα παρακάτω:

- **Ομάδα εργασίας 1** (Παράρτημα 13):
 - ❖ Κρίθηκε απαραίτητη η χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων των κουνουπιών.
 - ❖ Στα πλαίσια του προγράμματος θα χαρτογραφηθούν λεπτομερώς δυο περιοχές, η Σκάλα Λακωνίας και η Θεσσαλία. Στην περίπτωση που επαρκεί ο προϋπολογισμός θα χαρτογραφηθούν τα ενδιαιτήματα των κουνουπιών και σε άλλες περιοχές (π.χ. Μαραθώνας, Βοιωτία, Έβρος, Θεσσαλονίκη).

- 7 -

- Η δειγματοληψία θα εστιαστεί σε δυο είδη, το *Anopheles* spp. και το *Culex pipiens*, καθώς αποτελούν διαβιβαστές της ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου, αντίστοιχα.
- Η δειγματοληψία θα αφορά και προνύμφες αλλά και ενήλικα έντομα.
- Θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα περιέχει εντομολογικά, ιστορικά, μετεωρολογικά, και άλλα δεδομένα
- Ένας από τους στόχους είναι η δημιουργία οδηγιών σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων εντομοκτονίας που εφαρμόζονται ανά την ελληνική επικράτεια.
- Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη της συμπεριφοράς των κουνουπιών (επιθετικότητα, ανθρωπόφιλη συμπεριφορά, ώρες δραστηριότητας και δηγμάτων) στην περιοχή της Λακωνίας και σε άλλες προσβεβλημένες περιοχές, με στόχο τον προσανατολισμό στοχευμένων μέτρων καταπολέμησης τους.
- Θα πρέπει να γίνουν εσωτερικοί υπολλειματικοί ψεκασμοί (indoor residual spraying) ξεκινώντας από τους στάβλους, αποθήκες και πρόχειρα καταλύματα των μεταναστών και στη συνέχεια θα επεκταθούν οι ψεκασμοί στις οικίες του τοπικού πληθυσμού.

- Ομάδα εργασίας 2 (Παράρτημα 14):

- Οι ενότητες που θα περιλαμβάνονται στο state of the art για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα αφορούν σε έντομα, πτηνά, ιπποειδή και ανθρώπους σχετικά με:
 - Τρόπους μετάδοσης
 - Τρόπους διάγνωσης
 - Θεραπεία

- 8 -

- Μέτρα προστασίας

- Αποφασίστηκαν οι τύποι των παγίδων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συλλογή πτηνών και ο αριθμός των δειγμάτων αίματος ή ιστού που θα συλλεχθεί από πτηνά και ιπποειδή (80-100 άγρια πτηνά, 300 περιστέρια και 30 ιπποειδή).
- Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του ιικού φορτίου θα είναι η PCR και η RT-PCR.
- Οι περιοχές που έχουν επιλεγεί να μελετηθούν είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Αττική.
- Η μελέτη της οικολογίας πτηνών δυνητικών φορέων του ιού του Δυτικού Νείλου θα αφορά σε ορτύκια και δυο είδη πάπιας.
- Η ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του ιού του ΔΝ στα πτηνά και τα ιπποειδή θα πραγματοποιηθεί με ELISA, IFAT και PRNT, η μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού του ΔΝ στα πτηνά και τα ιπποειδή θα πραγματοποιηθεί με PCR και RT-PCR και η τυποποίηση και ο γενετικός προσδιορισμός των στελεχών που θα ανιχνευθούν θα γίνει με sequencing.
- Η παθολογοανατομική μελέτη ζώων θα αφορά σε 4 ιπποειδή και 10 πτηνά το χρόνο.
- Για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου σε οικόσιτα πτηνά θα συλλεχθούν 300 δείγματα περιστεριών και η εργαστηριακή μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η ELISA, ενώ για τη μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού θα χρησιμοποιηθεί PCR και RT-PCR.

- Ομάδα εργασίας 3 (Παράρτημα 15):

- Η πιο κοινά- 9 - χρησιμοποιούμενη μέθοδος

για την εργαστηριακή διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους είναι η ELISA για IgM και IgG. Η τιμή των κυτίων (kit) είναι 570 ευρώ ανά κυτίο και η ευαισθησία της μεθόδου κρίνεται πολύ καλή.

- Η μοριακή ανίχνευση του ιού θα πραγματοποιηθεί με RT-PCR.
- Απόκτηση της κατάλληλης τεχνογνωσίας για να εφαρμοστεί η μέθοδος των εξουδετερωτικών αντισωμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊών.
- Όσον αφορά στην οροεπιδημιολογική μελέτη σε ανθρώπους για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε όλη την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος «Θαλής», η εργαστηριακή μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δειγμάτων θα είναι η ELISA, που το κόστος της ανέρχεται στα 6-7 ευρώ ανά δείγμα.
- Όσον αφορά στην εξέταση δειγμάτων από ανθρώπους για ελονοσία, θα πραγματοποιείται μικροσκοπική εξέταση και τεστ ταχείας διάγνωσης (RDTs: SD Bioline, Carestart). Στη συνέχεια τα θετικά δείγματα θα αποστέλλονται στο εργαστήριο αναφοράς ελονοσίας για επιβεβαίωση με PCR.
- Θα συνεχιστεί η μοριακή γονοτυπία όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
- Αναφορικά με τις ορολογικές μεθόδους αποφασίστηκε να ελεγχθούν με IFA 50 περιπτώσεις ελονοσίας *Pl. vivax* ελονοσία με ενδείξεις «εγχώριας μετάδοσης» που διαγνώστηκαν το 2011 και 50 αρνητικοί μάρτυρες (παιδιά κάτω του ενός έτους) τόσο με το αντιγόνο *Pl. vivax* όσο και με το αντιγόνο *Pl. falciparum*. Ο Dr Georges Snounou προσφέρθηκε να προμηθεύσει τα κατάλληλα αντιγόνα.
- Σηζητήθηκε η ανάγκη κατάρτισης προγράμματος εκπαίδευσης εργαστηριακών για τη διάγνωση της ελονοσίας σε

- 10 -

όλη την Ελλάδα, με έμφαση τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

- Ομάδα εργασίας 4 (Παράρτημα 16):

- ◆ Η δικτυακή πύλη του προγράμματος θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στα περιεχόμενα της θα περιλαμβάνεται ενημερωτικό υλικό για την ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου, κατευθυντήριες οδηγίες διάγνωσης, εκπαιδευτικό υλικό (e-learning) κά. Καθορίστηκαν επίσης οι ομάδες χρηστών.
- ◆ Οι ενότητες που θα καλύπτονται στο State of the art για την ελονοσία θα είναι οι:
 - Τρόποι διάγνωσης
 - Τρόποι θεραπείας
 - Μέτρα προστασίας
- ◆ Όσον αφορά στην ενίσχυση της επιτήρησης της ελονοσίας σε ανθρώπους, κρίνεται απαραίτητη η δήλωση του νοσήματος από τους επαγγελματίες υγείας και η κατηγοριοποίηση των περιοχών της χώρας σε τέσσερα επίπεδα (level 0, 1, 2 και 3) ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου για την εμφάνιση/εξάπλωση της νόσου.
- ◆ Για την ελονοσία θα χρησιμοποιηθούν διαγνωστικοί και θεραπευτικοί αλγόριθμοι. Σε συμπτωματικά περιστατικά ή σε ασυμπτωματικά άτομα προερχόμενα από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, θα γίνεται έλεγχος με RDTs, και επί θετικού αποτελέσματος θα πραγματοποιείται έλεγχος με μικροσκοπική εξέταση. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος της μικροσκοπικής εξέτασης; θα αποστέλλεται αίμα στο Κέντρο Αναφοράς, ενώ επί αρνητικού αποτελέσματος, θα γίνεται επανέλεγχος σε 24 ώρες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
- ◆ Θα πραγματοποιηθούν- 11 - προγράμματα εκπαίδευσης

και ενημέρωσης ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας της περιοχής στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας.

- Ομάδα εργασίας 5 (Παράρτημα 17):

- Προτάθηκε η ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας των μεταναστών.
- Τονίσθηκε η σημασία των διαπολιτιστικών διαμεσολαβητών (intercultural mediators) στην επικοινωνία με τις κοινότητες των μεταναστών.
- Προτάθηκε να γίνεται έλεγχος των μεταναστών στον Έβρο και σε άλλα σημεία εισόδου στη χώρα με χρήση τεστ ταχείας διάγνωσης στους συμπτωματικούς και τους ασυμπτωματικούς από ενδημικές χώρες. Θα πρέπει να δημιουργηθούν λεπτομερείς οδηγίες θεραπείας ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και να εκπαιδευτεί το αρμόδιο προσωπικό.
- Θα πρέπει να χαρτογραφηθούν οι περιοχές όπου υπάρχουν μετανάστες και να πραγματοποιηθούν προγράμματα ενημέρωσης των μεταναστών για την ελονοσία.
- Ο Dr Snounou εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός προγράμματος παρεμβάσεων στο οποίο θα ελέγχονται όλοι οι μετανάστες σε σημεία εισόδου στη χώρα ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου και όσοι από αυτούς βρίσκονται θετικοί θα τους χορηγείται θεραπεία. Στα πλαίσια αυτού, θα μπορούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής πρακτικών μαζικής χημειοπροφύλαξης με χλωροκίνη (κάθε μία ή δύο εβδομάδες) σε μετανάστες προερχόμενους από ενδημικές χώρες. Το παραπάνω θα μπορούσε να εφαρμοστεί σαν επιπρόσθετο μέτρο σε περιοχές υψηλού κινδύνου, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα βασικά μέτρα ελέγχου.
- Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πραγματοποιηθεί πιλοτικός ορολογικός έλεγχος σε 50 κρούσματα ελονοσίας *PI. vivax* ελονοσία με ενδείξεις «εγχώριας μετάδοσης» που διαγνώστηκαν το 2011 και

- 12 -

50 αρνητικούς μάρτυρες (παιδιά κάτω του ενός έτους) τόσο με το αντιγόνο *Pl. vivax* όσο και με το αντιγόνο *Pl. falciparum*. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου κριθούν ικανοποιητικά, θα πραγματοποιηθεί οροεπιδημιολογική μελέτη σε δείγμα 300 κατοίκων και 600 μεταναστών στην περιοχή του Ευρώτα.

- ♦ Προτάθηκε η χρήση εμποτισμένων με εντομοκτόνο κουνουπιέρων (bednets) στους μετανάστες.

4. Συμπεράσματα

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στα εξής:

- Στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας σχετικά με τα γεωπληροφοριακά συστήματα (GIS) η οποία θα συγκροτηθεί άμεσα και υπεύθυνος συντονιστής θα είναι ο κ. Χατζηχριστοδούλου και προτεινόμενα μέλη οι κύριοι Ν. Μπιτσόλας, Α. Τσάτσαρης, Α. Γιαννακόπουλος και εκπρόσωπος από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
- Στη χρησιμότητα της χαρτογράφησης των ενδιαιτημάτων κουνουπιών και στη δειγματοληψία κουνουπιών από περιοχές υψηλού κινδύνου.
- Στη σημασία της επιτήρησης των πτηνών και των ιπποειδών για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου.
- Στη σημασία των προγραμμάτων ενημέρωσης τόσο του κοινού όσο και των ομάδων υψηλού κινδύνου και των επαγγελματιών υγείας που έχουν άμεση σχέση με τον έλεγχο και τη θεραπεία των δυο νοσημάτων.
- Στη σημασία του ελέγχου (screening) και της θεραπείας των μεταναστών στις πύλες εισόδου και κυρίως αυτών που προέρχονται από ενδημικές χώρες.
- Στη χρησιμότητα της γνώμης, της γνώσης και της εμπειρίας των ξένων εμπειρογνομόνων σε όλες τις ομάδες εργασίας.
- Στη διερεύνηση χρησιμότητας παρεμβάσεων σε μετανάστες (χημειοπροφύλαξη, ορολογικός έλεγχος και θεραπεία μεταναστών).
- Στη χρησιμότητα εφαρμογής εντομοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους (στάβλους, πρόχειρα καταλύματα κá) και της χρήσης κουνουπιέρων.

- 14 -

- 15 -



www.ygeia-pronoia.gr

Με την
συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

www.epanad.gov.gr



www.espa.gr

Παράρτημα 1. Πρόγραμμα εναρκτήριας συνάντησης

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα	
Έναρξη συνάντησης - Χαιρετισμοί	
09:00 – 09:15	<i>Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας</i> <i>Χαιρετισμός από τον κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος</i>
09:15 – 09:30	Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την ελονοσία <i>Καθηγήτρια Τζένη Κρεμαστινού</i>
09:30 – 09:45	«Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» - Παρουσίαση του προγράμματος <i>Αν. Καθηγητής Χρήστος Χατζηχριστοδούλου</i>
Διαλέξεις από Έλληνες ομιλητές	
09:45 – 10:00	<i>Σύνοψη των εξάρσεων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα – 2010-2011 (Overview of the outbreaks of WNV in Greece – 2010-2011), Dr Agoritsa Baka</i>
10:00 – 10:15	<i>Σύνοψη της κατάστασης σχετικά με την ελονοσία στην Ελλάδα – 2009-2011 (Overview of the malaria situation in Greece – 2009-2011), Dr Konstantinos Danis</i>
10:15 – 10:30	<i>Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος έναντι της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου 2010-2011 και την Ελονοσία στην Ελλάδα 2009-2011 (Measures for the protection of blood safety against WNV 2010-2011 and malaria in Greece 2009-2011), Assoc. Prof. Constantina Politis</i>
Διαλέξεις για εντομολογικές μελέτες στην Ελλάδα	

- 16 -

10:30 – 10:45 *Εντομολογική μελέτη για το ΚΕΕΛΠΝΟ*
(*Vector surveillance study for Hellenic Center for Disease Control & Prevention*), Dr Spyros Mourelatos

10:45 – 11:00 *Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – 2011*
(*Mosquitoes control in East Macedonia and Thrace – 2011*), Mr Panagiotis Pergantas

11:00 – 11:20 **Διάλειμμα – Καφέ**

Διαλέξεις από ξένους ομιλητές

11:20 – 11:40 *Ενημέρωση για τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα για την ελονοσία από το ECDC*
(*Update on ECDC workshop on malaria*), Dr Herve Zeller, Dr Wim Van Bortel

11:40 – 12:00 *Νέες εξελίξεις σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας*
(*New developments regarding malaria laboratory diagnosis*), Dr Philippe Gillet

12:00 – 12:20 *Νέες εξελίξεις σχετικά με τον γονοτυπικό προσδιορισμό της ελονοσίας*
(*New developments regarding malaria genotyping*), Dr Georges Snounou

12:20 – 12:40 *Δυσκολίες στον έλεγχο και τη θεραπεία ελονοσίας σε μετανάστες*
(*Difficulties in screening and treating immigrants for malaria*), Dr Martin De Smet

12:40 – 13:00 *Συζήτηση*

13:00 – 14:15 : **Μεσημβρινή διακοπή - Γεύμα**

Ομάδες εργασίας

14:15 – 16:15 **ΟΕ1:** Έντομα διαβιβάστες του ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας

ΟΕ2: Ιός του Δυτικού Νείλου σε άγρια πτηνά, υποειδή και οικόσιτα πτηνά

ΟΕ3: Ελονοσία και ιός του Δυτικού Νείλου – εργαστηριακά σε ανθρώπους, οροεπιδημιολογική μελέτη σε πανελλήνιο δείγμα για τον ιό του Δυτικού Νείλου

ΟΕ4: Ελονοσία και ιός του Δυτικού Νείλου – επιτήρηση σε ανθρώπους, διάγνωση και θεραπεία ενημέρωση κλινικών ιατρών

ΟΕ5: Ελονοσία και ιός του Δυτικού Νείλου - Screening στους μετανάστες για ελονοσία, οροεπιδημιολογική μελέτη ελονοσίας στη Λακωνία, ενημέρωση κοινού-μεταναστών για την ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου

- 17 -

16:15 – 16:30	: Διάλειμμα – Καφές
16:30 – 17:00	: Συζήτηση – Συμπλήρωση των ερωτημάτων προς συζήτηση των ομάδων εργασίας

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα	
09:00 – 10:30	Συνέχεια ομάδων εργασίας
10:30 – 10:45	: Διάλειμμα - Καφές
10:45 – 12:30	Συνέχεια ομάδων εργασίας
12:30 – 13:45	: Μεσημβρινή διακοπή - Γεύμα
13:45 – 15:15	Συνέχεια ομάδων εργασίας
15:15 – 15:30	: Διάλειμμα - Καφές
15:30 – 17:00	Συζήτηση – Συμπεράσματα όλων των ομάδων εργασίας – Λήξη συνάντησης

- 18 -

Παράρτημα 2. Λίστα συμμετεχόντων

Επώνυμο	Όνομα	Φορέας / Οργανισμός	e-mail
Αθανασίου	Λαμπρινή	Κτηνιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	lathan@vet.uth.gr
Βακάλης	Νικόλαος	Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας	nikvakalis@gmail.com
Βάσαλος	Κωνσταντίνος		vassalos.constantine@gmail.gr cmvassalos@noskypar.gr
Βασσάλου	Ευδοκία	Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας	
Βεϊζης	Απόστολος	Γιατροί Χωρίς Σύνορα	apostolos.veizis@athens.msf.org
Βερναρδάκη	Αλεξάνδρα	ΚΕΕΛΠΝΟ	vernadaki@keelpno.gr
Βρυώνη	Γεωργία	Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών	gvrioni@med.uoa.gr
Γεωργακοπούλου	Θεανώ	ΚΕΕΛΠΝΟ	georgakopoulou@keelpno.gr
Γιαννακόπουλος	Αλέξης	Κτηνιατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	alexiosg@yahoo.gr
Δάγκας	Αθανάσιος	Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	athdagkas@hotmail.com
Δέτσης	Μάριος	ΚΕΕΛΠΝΟ	m1detsis@yahoo.gr detsis@keelpno.gr
Διαμαντίδης	Αλέξανδρος	Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	alexdiamandidis@yahoo.gr
Διαμαντόπουλος	Βασίλειος	ΔΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου	roussou@arcadia.gr
Διονυσοπούλου	Μάρθα	Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης	-

- 19 -


Δόβας	Χρυσόστομος	Κτηνιατρική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	dovas@vet.auth.gr
Δουγιάς	Γιώργος	ΚΕΕΛΠΝΟ	dougas@keelpno.gr
Ευλαμπίδου	Ηρώ	Γιατροί Χωρίς Σύνορα	iro.evlampidou@medea.gr
Ζούνος	Αθανάσιος	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	azounos@yahoo.gr
Ιατρού	Γιώργος	Οικοανάπτυξη	info@ecodev.gr
Κάκκαλου	Ελένη	Γιατροί Χωρίς Σύνορα	ekakalou@yahoo.gr
Καλλιμάνη	Αθηνά	ΚΕΕΛΠΝΟ	kallimani@keelpno.gr
Καλογνωμά	Ζωή	Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	zkalognoma@med.uth.gr
Κασιμάλη-Βαϊοπούλου	Βιολέττα	Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών	vkapsimali@med.uoa.gr
Κεφαλούδη	Χρυσοβαλάντου	ΚΕΕΛΠΝΟ	kefaloudi@keelpno.gr
Κιούλος	Ηλίας	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	kioulose@yahoo.ca
Κολιόπουλος	Γιώργος	Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο	gkoliop@gmail.com & gkoliopoulos@bpi.gr
Κρεμαστινού	Τζένη	ΚΕΕΛΠΝΟ	jkremastinou@esdy.edu.gr
Λάμπρου	Αγγελική	ΚΕΕΛΠΝΟ - Τμήμα Επιδημιολογίας	labrou@keelpno.gr
Λιόνα	Κατερίνα	ΚΕΕΛΠΝΟ	liona@keelpno.gr
Λυμπεράκης	Πέτρος	Φορέας Διαχείρισης Φαραγγιού Σαμαριάς	-
Μουρελάτος	Σπύρος	Οικοανάπτυξη	info@ecodev.gr

Μπάκα	Αγορίτσα	ΚΕΕΛΠΝΟ	baka@keelpno.gr
Μπαλάσκα	Μίνα	ΚΕΕΛΠΝΟ	balaska@keelpno.gr
Μπελερή	Σταυρούλα	Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας	-
Μπιλλίνης	Χαράλαμπος	Κτηνιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	billinis@vet.uth.gr
Μπίρτσας	Περικλής	Κτηνιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	pbirtsas@hunters.gr
Μπιτσόλας	Νίκος	Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	nmpits@med.uth.gr
Μπορδώκα	Αντελίνα	ΔΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου	roussou@arcadia.gr
Μωραΐτης	Ιωάννης	Βιο-εφαρμογές	info@bioapplications.gr
Ντάκου	Νίκη	ΚΕΕΛΠΝΟ	ntakou@keelpno.gr
Ντάνης	Κώστας	ΚΕΕΛΠΝΟ	daniscostas@yahoo.com danis@keelpno.gr
Οικονόμου	Αλκιβιάδης	Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)	aecono@ath.hcmr.gr
Οικονόμου	Ελένη		aecono@ath.hcmr.gr
Πανταζοπούλου	Αναστασία	ΥΥΚΑ	gddy@yyka.gov.gr pantazopoulou@yyka.gov.gr
Παπά	Άννα	Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποιών Θεσσαλονίκης	annap@med.auth.gr
Παπαβασιλόπουλος	Βασίλης	Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας	-
Παπαγιαννοπούλου	Αγγελική	Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	angelapapagiannopoulou@yahoo.com
Παπαδόπουλος	Νικόλαος	Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	nikopap@agr.uth.gr

Παπανικολάου	Βάλια	ΚΕΕΛΠΝΟ	papanikolaou@keelpno.gr
Πατσουλά	Ελίνα	Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας	-
Περβανίδου	Δανάη	ΚΕΕΛΠΝΟ	pervanidou@keelpno.gr
Περγαντάς	Παναγιώτης	Βιο-εφαρμογές	pergantas@bioapplications.gr
Πίπα	Ευθαλία	ΚΕΕΛΠΝΟ	pipa@keelpno.gr
Πιπεράκη	Ευαγγελία-Θεοφανώ	Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών	epiper@med.uoa.gr vagge71@yahoo.com
Πολίτη	Κωνσταντίνα	Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ)	cpolitis@hol.gr
Ραχιώτης	Γιώργος	Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	gsrachmed@yahoo.com
Ρούσσου	Αικατερίνη	ΔΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου	roussou@arcadia.gr
Σαρόγλου	Γεώργιος	ΚΕΕΛΠΝΟ	gs200744@otenet.gr
Σπανάκος	Γρηγόρης	Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας	-
Σταματόπουλου	Ελένη	Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας	-
Σταυρίδης	Δημήτρης	Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας	dim_stavr@yahoo.gr
Τέγος	Νικόλαος	Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας	-
Τερζάκη	Ειρήνη	ΚΕΕΛΠΝΟ	terzaki@keelpno.gr
Τόντης	Δημήτρης	Κτηνιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	dtontis@vet.uth.gr
Τσακρής	Αθανάσιος	Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Αθηνών	atsakris@med.uoa.gr

Τσάτσαρης	Ανδρέας	Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής	atsats@teiath.gr
Τσελέντης	Ιωάννης	Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης	yannis.tselentis@gmail.com tselendi@med.uoc.gr
Τσερκέζου	Πέρσα	Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	petserke@med.uth.gr
Τσερώνη	Μαρία	ΚΕΕΛΠΝΟ	mariatseroni@googlemail.com
Τσιόδρας	Σωτήριος	Ιατρική, Πανεπιστήμιο Αθηνών	tsiodras@med.uoa.gr stsiiodras@hotmail.com
Χατζηχριστοδούλου	Χρήστος	Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	xhatzi@med.uth.gr
Ψαρουλάκη	Άννα	Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης	annapsa@med.uoc.gr
Ξένοι συμμετέχοντες			
De Smet	Martin	Leader of the MSF Malaria Working Group, Belgium	martin.de.smet@brussels.msf.org
Gillet	Philippe	Institute of Tropical Medicine, Department of Clinical Sciences, Unit of Tropical Laboratory Medicine, Belgium	pgillet@itg.be
Snounou	Georges	Faculty of Medicine, University of Pierre and Marie Curie	georges.snounou@upmc.fr
Van Bortel	Wim	Office of the Chief Scientist, Emerging and vector-borne diseases, European Center for Disease Prevention and Control	Wim.vanBortel@ecdc.europa.eu
Zeller	Herve	Office of the Chief Scientist, Emerging and vector-borne diseases, European Center for Disease Prevention and Control	Herve.Zeller@ecdc.europa.eu

Παράρτημα 3. Παρουσίαση του προγράμματος «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία - Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια



Kick off meeting
26th-27th January 2012

Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece

Assoc. Prof. Christos Hadjichristodoulou

Partners

- **Coordination**
 - Laboratory of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Thessaly
- **Associate partners**
 - Hellenic Center for Disease Control and Prevention (HCDCP)
 - National School of Public Health (NSPH)
 - Benaki Phytopathological Institute
 - Laboratory of Entomology and Agricultural Zoology, University of Thessaly
 - Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly
 - School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
 - Laboratory of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens
 - Reference Centre for Arboviruses, Aristotle University of Thessaloniki
 - Regional Public Health Laboratory, Crete

General objectives

1. The main objective is the development of an Integrated Control Programme related to:
 - **West Nile Virus (WNV):**
 - Surveillance for human cases
 - Mosquito surveillance
 - Avian surveillance
 - Equine surveillance
 - **Malaria**
 - Surveillance for human cases
 - Mosquito surveillance



General objectives

2. The aims of the Integrated Control Programme are to:
 - detect WNV and *Plasmodium* activity in Greece
 - assess the human health threat
 - identify geographical areas of high risk for WNV and malaria
 - assess the need for targeted interventions.

- 24 -

Work Packages (WP)



Work Package 1

Title:

- Coordination of the project, dissemination of the results

Objectives:

- Day-to-day management and coordination
- Communication among partners
- Financial management
- Evaluation of the project
- Dissemination of the results
- Conference
- Design and development of a web site within the HCDCP web portal

Work Package 2

Title:

- State of the art report for WNV and malaria surveillance and control

Objectives:

- Assessment of existing relevant surveillance systems and control activities for WNV and malaria
- The data will be collected by:
 - Scientific papers
 - Formal web sites
 - Scientific books
 - Guidelines
 - Formal reports

Work Package 3

Title:

- Study on presence, seasonal variation and spatial distribution of mosquitoes and design of an Integrated Mosquito Management plan

Objectives:

- Mosquito-based surveillance
- Data on mosquito populations and infection rates
- Identification of high risk geographical areas
- Development of a better understanding of transmission cycles and potential vector species
- Education of health professionals of the regional public health authorities for the Integrated Mosquito Management plan

Work Package 4

Title:

- Domestic/wild bird and equine surveillance of WNV

Objectives:

- Study on birds ecology which are potential WNV vectors
- Anti-body detection, quantitative determination and molecular typing of WNV in birds and equine
- Study on pathogenicity of WNV in birds and equine
- Study on seroconversion in domestic bird species

Work Package 5

Title:

- Sero-epidemiological studies on WNV and malaria

Objectives:

- Sero-epidemiological study on WNV
 - Sampling methodology
 - Questionnaire, blood sampling collection
 - Serological tests
- Detection of *Plasmodium* spp. in immigrants and refugees come from endemic malaria areas
 - Blood sampling collection
 - *Plasmodium* detection by using molecular techniques

Work Package 6

Title:

- Enhanced surveillance for human cases

Objectives:

- Improvement of the diagnostic capacity of WNV and malaria
- Support of Reference Laboratories for WNV and malaria
- Integrated correlation analysis of both surveillance data from mosquitoes and humans (using GIS)

Work Package 7

Title:

- Targeted intervention activities for WNV and malaria

Objectives:

- Health promotion campaigns for:
 - High risk Regions
 - Immigrants
 - Health professionals
- Application of Integrated Mosquito Management plan in high risk areas

Conclusions

- Collaborative partners will be the Regional Authorities
- The activities of the project will be implemented under the supervision of the General Directorate of Ministry of Health and Social Solidarity

If all the partners work together in harmony and in collaborative spirit,
the only result of the initiative is the **SUCCESS!!!**



- 27 -

Παράρτημα 4. Συνοπτική παρουσίαση των εξάρσεων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα (2010-2011)



Outbreak of West Nile virus infection in Greece, 2010-2011


Hellenic Centre of Disease Control & Prevention

Topics

- 2010 outbreak in Greece
- Post-epidemic seroprevalence study in outbreak epicentre in 2010
- 2011 outbreak in Greece
- Control measures

1

Clinical overview



WNV outbreak in humans in Greece, 2010

- 28 -

Initial events

- **4 August 2010:**
 - Physicians from Inf Dis Hospital in Thessaloniki, Northern Greece reported increase in encephalitis cases (mainly elderly from Central Macedonia)
- **5 August 2010:**
 - 10/11 serum and all 3 CSF samples sent to Reference Lab showed high IgM & IgG titres against **WNV**
- **6 August 2010:**
 - EWRS & Public announcement
- WNV infection in humans or animals had not been previously documented in Greece



Previous studies


- Serological surveys in 1980's and 2007 identified WNV antibodies in 1% of humans in Central Macedonia
- 1980's study: Higher seropositivity (1.4-8.8%) in animals (goats, cattle, horses)
- Intensive surveillance on blood donor samples in 2006-07 failed to reveal positive results




Reported WNV cases, 2010

	Number
Neuroinvasive cases	197
Non-neuroinvasive cases	65
Hospitalised in ICU	23
Hospitalised cases (overall)	250
Total	262

Number of WNV-neuroinvasive (WNND) cases by week of onset of symptoms



Incidence of WNND cases by township, 2010



Clinical manifestations of WNND cases

Syndromes	N (%)
Encephalitis	168 (87.9)
Meningitis	23 (12.1)
Flaccid paralysis without meningoencephalitis	6 (3.1)
Other signs	
Rash	28 (14.7)
Flaccid paralysis	4 (2.1)
Underlying diseases	147 (77.0)
Hypertension	73 (38.3)
Heart disease	51 (26.7)
Diabetes	46 (24.1)
Immunosuppression	24 (12.5)
Deaths	35 (18.3)



Risk factors for death

	Case fatality rate (%)	Adjusted Risk Ratio* (95% CI)
Agegroup		
40-59	2.5	Ref
60-69	6.9	2.7 (0.3-28.4)
70-79	17.6	6.1 (0.8-45.2)
≥80	34.8	11.4 (1.6-83.5)
Heart disease		
Yes	32.6	2.4 (1.9-5.5)
No	12.0	Ref

*K. Danis et al. Emerg Infect Dis. 2011;10

Entomological findings 2010

- 212 samplings of adult mosquitoes (n=8956) collected from CO₂ traps from >100 villages


Mosquito species	%
<i>Culex spp</i>	86.9
<i>Aedes spp</i>	12.3
<i>Anopheles spp</i>	0.8



- Predominant: *Culex pipiens* (optimal breeding site=water with animal/human waste)
- WNV lineage 2 detected in 3 pools of *Culex pipiens* from affected area (the first from New Santa village (30 km from Thessaloniki)), 2 blood donors and 1 bird

11


- 30 -



WNV infections among birds



- WNV-IgG detected in 24% (8/34) of wild pigeons close to an area of affected horses
- Seroprevalence (IgG) study in 1-year old domestic pigeons: Patterns similar to WNV notification rates in humans



Post-epidemic seroprevalence study

Methods

- Conducted in the epicentre of 2010 outbreak
 - to estimate the proportion of the population infected with WNV
 - to identify risk factors for infection
- Two-stage cluster sampling was used
 - 360 randomly selected households
 - Blood samples collected from 644 participants and tested for WNV IgG

16

- 31 -

Results

- 41 /644 total samples WNV IgG +
- 5.8%** [95% CI: 3.8-8.6] adjusted seroprevalence
- Can extrapolate this figure to calculate an estimate of **28,000** infections during the epidemic
- Neuroinvasive cases **1:140**

17

Risk factors for WNV infection

Exposure	WNV IgG seropositivity (adj. %)	Adjusted PR (95% CI)
Population density		
Urban (>20 000)	1.4	Ref
Ruual/suburban (<20 000)	8.2	8.2 (1.1-58.7)
Agricultural labour		
No	3.7	Ref
Yes	12.3	2.9 (1.3-6.4)
Employment status		
Employed/other occupation	2.8	Ref
Retired	11.6	2.6 (1.4-4.9)
Housewife	8.9	4.3 (2.2-8.5)
Water repositories on property		
No	4.6	Ref
Yes	16.1	2.7 (1.4-5.0)

Seroprevalence study-Conclusions


- Widespread transimssion of WNV in the outbreak epicentre
- ~28,000 estimated infections based on IgG seroprevalence of 5.8%
- Rural areas particularly affected
- Risk factors identified reflect increased exposure to mosquitoes
- Particular attention should be paid to risk groups when planning prevention strategies such as health education and mosquito control activities

19

2011 Outbreak

- 32 -


WNV in Europe-2011 (as of 29/09/11)




Reported WNV cases, 2011

	Number
Neuroinvasive cases	76
Non-neuroinvasive cases	25
Imported cases	1
Hospitalised in ICU	3
Deaths	9
Case-fatality rate	11,8%
Total	101


Number of WNV-neuroinvasive (WNND) cases by week of onset of symptoms, 2011




WNND cases, 2011 (as of 20/10/2011)



Age distribution of West Nile neuroinvasive cases, 2010-2011



WNV in mosquitoes, 2011




Entomological findings, 2011

- 150 CO₂ mosquito traps across the country
- ≈ 45,000 mosquitoes collected
- 13 *Culex spp* pools positive for WNV
- Lineage 2 WNV sequences were obtained from one pool of *Culex pipiens* trapped in Ag. Athanasios village, Central Macedonia
- Highest homology (99.4%) to the lineage 2 Nea Santa/Greece/2010 WNV strain
- An identical strain was also detected in seroconverted sentinel chickens in the same place
- Lineage 1 WNV identified in Western Greece (Aktio) in a French case diagnosed in France



WNV infections among equines, 2011

- 8 reported sick horses from areas where human cases occurred (0 deaths)
- The first two cases in horses identified before human cases had been reported in Attiki (early warning signal)
- 16 outbreaks detected in total, in 8/16 affected horses were asymptomatic



Control measures

- Raising awareness amongst clinicians
- Health promotion activities (personal protection from mosquitoes)
- Strengthening of mosquito control
 - Periurban and urban larviciding
 - Ultra-Low Volume (ULV) ground adulticiding in villages with reported human cases



Discussion I

- 2010 first recognised WNV outbreak in humans in Greece; Second largest WNV outbreak in Europe (since Romania 1997)
- Lineage 2 WNV more pathogenic than previously thought
- High case fatality, possibly due to:
 - More pathogenic strain
 - Under-reporting of non-fatal cases?
 - Poor health care services?
- *Culex pipiens* predominant vector

Discussion II

- Following intense WNV amplification in 2010, the virus seems to disperse southward to newly affected areas
- Similar dispersal patterns in California, where WNV was introduced in 2003 and quickly spread throughout state
- Reoccurrence of infections in two consecutive years and the spread of the virus in newly affected areas, suggest that WNV is established in Greece and transmission may continue in the future
- Changing climate and ecological parameters might have influenced the WNV transmission cycle

References

- K. Danis et al. Emerg Infect Dis. 2011;10
- Danis K, Papa A, et al.. Euro Surveill. 2011 Aug 25;16(34). pii: 19951. PubMed PMID: 21903037.
- Papa A, Danis K, et al. Euro Surveill. 2010;15(34):pii=19644.
- Papa A, et al. Clin Microbiol Infect. 2011;17(8):1176-80.
- Papa A, Bakonyi T, et al. Emerg Infect Dis. 2011;17(5):920-2.

33


- 35 -

Acknowledgements to:

- The **co-authors**:
A. Papa, G. Theodoropoulos, A. Bakas, M. Detsis, T. Lytras, A. Baka, G. Dougas, M. Athanasiou, C. Politis, S. Mourelatos, C.I. Doxas, N. Diakakis, M. Papanastassopoulou, D. Dilaveris, O. Mangana, G. Saroglou, T. Panagiotopoulos
- The personnel in the **Reference Laboratory for Arboviruses**
- **Veterinary School** of Aristoteio University of Thessaloniki
- The coordinating team in Thessaloniki and the dedicated staff of **KEELPNO Thessaloniki**
- The personnel of **Ecodevelopment SA**
- **Ministry of Agriculture**
- All hospital physicians and local public health authorities who contributed to the surveillance of WNV infections in Greece


34

Climatic conditions in outbreak epicentre



WNV infections among equines, 2010

- 14 (4.26/1,000) reported sick horses from areas where human cases occurred (3 death)
- Disease onset later than of human cases, but peak of epidemic coincided with that in humans
- WNV-antibodies found in 82/192 (43%) tested horses
- WNV-IgM detected in 29/134 (22%) tested horses from 27 stables



Blood Transfusions

General Measures

- Deferral of potential donors for 28 days after visiting an affected area
- Guidance for 15-day follow up of all donors that develop fever post-donation
- WNV cases accepted for donation 120 days after diagnosis

Local Measures

- Quarantine of all in-date components for transfusion collected from affected areas (July - 22nd August 2010)
- Implementation of ID-NAT testing of blood for WNV-RNA in all affected areas since 25th August-1st November 2010 & July 2011-now

- 36 -

Παράρτημα 5. Συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης σχετικά με την ελονοσία στην Ελλάδα (2009-2011)



Malaria in Greece, 2011

Kostas Danis

Department of Surveillance, Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (KEELPNO)

1

Contents

- Epidemiological update
- Ecological parameters
- Entomological findings
- Control measures

2

Malaria in Greece, 1960-2010

- Greece endemic country in mid-20th century
- National malaria eradication programme: 1946 - 1960
- 1974: WHO declares Greece malaria-free
- 1975-2010: 30-50 imported malaria cases reported annually
- Reports of sporadic locally acquired cases in 1991, 1999, 2000
- 78% of cases reported during 2005-2010 were migrants from endemic countries



3


Cluster of domestic cases in Evrotas, Lakonia, 2009



4

- 37 -

Non-imported malaria cases, Greece, 2010




P. Vivax malaria cases, affected areas, 2011

	Number
Cases from non-endemic countries	40*
Cases from endemic countries in Evrotas	23†
Total	63

*34 from Evrotas, Lakonia
† from Evrotas area


6

Place of residence of malaria cases, Greece, 2011



7

Place of residence of malaria cases, Evrotas, Lakonia, 2011




Red dots : migrant (possibly imported/ Yellow dots: Greek cases

8

- 38 -

Number of malaria by date of symptom onset, Greece, 2011



9

Reported malaria cases by country of origin, Evrotas, Lakonia, 2011

	Number
Greeks	27
Migrants from non-endemic countries	7
Romania	5*
Poland	1
Morocco	1
Total (with no travel history)	34
Migrants from endemic countries	23
Pakistan	21
Afghanistan	2
Total	57

*2 migrant farm workers diagnosed in Romania, upon their return from Evrotas



Age & gender distribution

- Age ranged from 1.5-79 yrs (median; 36 yrs)
- Median age (24 yrs) of migrant cases lower ($p < 0.001$) than of Greek cases (47 yrs)
- 75% were male (57% male in Greeks)

11

Laboratory diagnosis

- Microscopic diagnosis $\Rightarrow$ local labs
- Blood samples from all (+) cases $\Rightarrow$ Reference lab
 - Giemsa, PCR, genotyping
- Rapid tests not routinely used




- 39 -

Treatment of cases


- All cases were diagnosed with *Plasmodium vivax*
- Almost all cases received Chloroquine (3d) & Primaquine (14d) after being tested for G6PD deficiency
- One (1.6%) case in ICU
- One (1.6%) fatality (pulmonary co-infection & underlying diseases)

13

Map of Evrotas (Land use)



Map of Evrotas (Irrigation & drainage network)




Ecological situation of Evrotas



- 40 -

Distribution of land cover class (%) by 7 km buffer zone



Source: Corine land cover class 2006


17

Anopheles species in Greece

Anopheles Species	Potential malaria vector in Greece
<i>An. algeriensis</i>	
<i>An. atroparvus</i>	
<i>An. claviger</i>	X
<i>An. hyrcanus</i>	X
<i>An. labbranchiae</i>	
<i>An. maculipennis</i>	X
<i>An. marteri</i>	
<i>An. messeae</i>	
<i>An. melanoon</i>	
<i>An. plumbeus</i>	
<i>An. pseudopictus</i>	
<i>An. sacharovi</i>	X
<i>An. sergentii</i>	
<i>An. subalpinus</i>	
<i>An. superpictus</i>	X

18

Adult sampling (CO₂ traps) in Evrotas



Predominant species in other areas: *An. sacharovi*, *An. claviger*

Surveillance of malaria

Malaria notifiable disease in Greece
(passive surveillance system)



In places where domestic transmission is suspected

- Enhanced surveillance**
 - Visiting homes, face-face interviews with reported cases
- Weekly calls to local labs**
- Active case detection**
 - House to house visits in Evrotas (as of 01/10/2011)

21

Case investigation form


- Gathers info on:

- Case history
- Detailed travel history
- Potential modes of transmission
- Clinical manifestations & treatment
- Previous clinical episodes
- Possible onward transmission
- Household characteristics
- Lab results




22

Active case finding: Urban mapping (I)



Active case finding & treatment (II)

- Briefing of population in advance
- House-house active case finding in Evrotas (since 1/10/11)
- If fever $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ or reported fever during previous 2 weeks, blood smear taken
- Blood samples also collected from household contacts & neighbors of malaria cases
- Prompt DOT treatment of lab confirmed cases



24

Active case finding & treatment (III)

- As of 31/12/11:
 - 3560 houses visited
 - 6655 people seen (of whom 2018 migrants)
 - 352 blood samples collected
 - 10 (2.8%) cases detected (9 migrants & 1 Greek)
 - 5 (1.4%) with fever
 - 2 (0.6%) with reported fever
 - 3 (2.2%) of 139 asymptomatic household contacts of cases from endemic countries (PCR+)
 - 3 other cases referred to hospital (2 Greeks & 1 Romanian)
- DOT treatment in 20 cases

25

Vector control & blood safety

- Mapping project for risk areas
- Larviciding in breeding sites (since 1/7)
- 3 Ultra Low Volume (ULV) applications in the affected villages/ towns
- Outdoor residual spraying (659 installations, stockyards)
- Indoor residual spraying (only 18)
- Deferral of blood donations from affected areas within 10km for 6 months



26

Discussion (I)

- All affected areas were agricultural, non-touristic, close to wetlands, with large populations of migrant farm workers
- Change in geographical origin of migrant farm workers, with influx of immigrants from Indian subcontinent in 2010
- 2007 significant drought compromised population of larvivorous fish & amphibians → Increased mosquito populations

27

Discussion (II)

- Late mosquito abatement, due to admin restructuring. Indoor residual spraying not done extensively.
- Vector behavior studies necessary
- Transmission in Evrotas area, may result from several mechanisms:
 - Introduction of malaria every year through migrants

28

Discussion (III)

- Greece might be vulnerable for re-establishment of malaria, due to:
 - mosquito populations
 - increased number of migrants from endemic countries
- Provided that healthcare, mosquito control and public health infrastructures remain intact, re-establishment unlikely
- Conditions may exist for small clusters of locally acquired transmission to occur sporadically
- Integrated preparedness and response plan that covers surveillance, clinical management, laboratory diagnosis, entomological surveillance, vector control and communication is being developed

29

- 43 -


Acknowledgements to:

- ECDC experts: Annick Lenglet, Wim van Bortel, Herve Zeller
- WHO experts: Aafje Rietveld, Rossitza Mintcheva, Elkhana Gasimov
- Maria Tseroni and the ACD team
- Prof Vakalis and the personnel in Reference Malaria Laboratory
- Giannis Grypiotis, mayor of Skala
- The personnel of Ecodevelopment SA
- Hospital physicians in Sparta and local public health authorities who contributed to the surveillance & control of malaria in Greece

30

Plasmodium genotyping

Courtesy of N. Vakalis, NSPH, unpublished data



Polymorphism at the membrane surface protein, *Plasmodium vivax*

Entomological findings

- Evrotas: 23 adult *An. sacharovi* + 2 potential *An. plumbeus*
- Marathon: *An. claviger* (dominant)
An. algeriensis, *Anopheles An. maculipennis*,
An. pseudopictus, *An. sacharovi*.
- Other areas: *An. sacharovi*, *An. claviger*



35



Health Promotion

Also in Pakistani, Bulgarian, Romanian, and Russian with the assistance of ECDC

36

Communication campaigns protection from mosquitoes

- Children's story:
 - Distribution at schools
- Posters & Brochures (more than 1,5 million)
 - Churches
 - Post Offices
 - City Halls
 - Health Centres and Hospitals
- TV Spot: circulated during prime-time during summer months
- KEELPNO website www.keelpno.gr
 - Information material on WNV & Malaria

37

- 45 -



www.ygeia-pronoia.gr

Με την
συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

www.epanad.gov.gr




www.espa.gr


Παράρτημα 6. Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος έναντι της λοίμωξης για τον ιό του Δυτικού Νείλου (2010-2011) και την ελονοσία στην Ελλάδα (2009-2011)

Measures for the protection of blood safety against WNV 2010-2011 and Malaria 2009-2011 in Hellas  Constantina Politis Associate Professor of Medicine, Athens University Scientific Advisor to KEELPNO Head of the Coordinating Haemovigilance Centre (SKAE) Chairperson of the Blood Transfusion Committee of the National Blood Centre (EKEA)	WNV and blood safety Historical review Intensive surveillance of 9,590 blood donations and 115 CSF samples from patients with aseptic meningitis in Southern Greece in June-October 2006 and 2007, revealed no positive results for WNV by NAT (Kantzanou, Politis, Hatzakis et al, Trans Med 2009, 19)
---	---

WNV outbreak, 2010-2011 Public health measures Public health measures including an action plan for blood safety were applied upon epidemiological evidence for human neuroinvasive cases – WNND First outbreak 2010 On 7th August 2010 KEELPNO reported 21 laboratory diagnosed WNND cases from Central Macedonia (two had a fatal outcome) Second outbreak 2011 On 27th July 2011 KEELPNO announced the first laboratory diagnosed WNND case from Karditsa-Thessaly	Action Plan for Protecting the Blood System 2010-2011 Proposed by the Coordinating Haemovigilance Centre (SKAE) of KEELPNO and subsequently accepted by the National Blood Centre and the Public Health Authorities of the Ministry of Health Based on: •Directive 2004/33/EC •The “Guide” of the Council of Europe •ECDC meeting report, Expert Consultation on WNV infection, EU August 2009 •Updated opinion on “The safety of human blood and organs with regard to WNV”, SCENIHR, 2005 •ECDC meeting report: Consultation of the ECDC Competent Bodies for Preparedness and Response, October 2008 •Bibliography
--	--



WNV 2010-2011	Local Measures (apply to affected areas)
General Measures (nationwide) • Information and raising awareness of the BTS regarding WNV infection • Reinforcement of the donor clinical evaluation, particularly for residents of, or visitors to, the affected areas (EU definition) • Deferral of potential blood donors for a period of 28 days after leaving an area with ongoing transmission of WNV to humans and in which at least one autochthonous WNND has occurred (<i>in conformity partly with Directive 2004/33/EC</i>) • Persons with diagnosis of WNV infection may be accepted as blood donors 120 days after diagnosis (<i>in conformity with the Guide of the Council of Europe</i>)	2010 • Quarantine of blood products and retrospective testing with NAT 2010 & 2011 • Implementation of NAT testing in the affected areas and also in adjacent areas, if appropriate • From 18th August 2011 availability of NAT testing for blood donors who visited the affected areas of Athens and Thessaloniki in the last 28 days Measures similar to those applied in 2010 and in compliance with the EU Preparedness Plan (<i>final working document 2011 v.1.1.</i>)



Post donation infection, 2010-2011

- Sporadic cases of blood donors presenting with flu-like symptoms 14 days after donation have been recorded
- One presumably asymptomatic and WNV-RNA negative donor reported fever, headache and arthralgias 4 days after donation. The blood unit was discarded but a new sample was not taken for testing. Two months later he was retested and found positive for IgM and IgG antibodies.

Escaping non-WNVD case

- Another donor concealed history of high fever and skin rash 7 days prior to donation and found WNV-RNA positive. The event was admitted by the donor when he was notified by the blood centre and asked to give a second sample.

Thalassaemic patients and WNV

Retrospective study during 1st July – 30th September 2010

Patients n=369, transfusions 4,797 (13/patient)

Patients	Positive
WNV-RNA	0
IgM	0
IgM + IgG	1
IgG	6
Total	7 (1.9%)

} Implied blood donors n= 92,
Available stored samples n= 41

First transfusion transmission in thalassaemia (before NAT testing)

In 2 patients from 2 different blood donors
(one WNV-RNA positive and another IgM + IgG positive)

There was one further inconclusive case with IgG

Impact on blood supply, 2010-2011

- The impact of the preventive measures on the blood supply was moderate (2%) in 2011 and significantly less than in last year's epidemic (10%)
- However, the widespread epidemic had an impact on the management of blood donors who have visited the affected areas.
- Blood testing with NAT of most cases led to maintaining those blood donors who comprise up to 24% of total in some areas

Lessons learnt

- Surveillance of WNV infection in blood donors provides significant information about the asymptomatic carriage of the disease
- Non-WNVD may escape attention during donor interview and medical examination
- In addition to basic precautionary measures for the protection of the blood system, post-donation information and post-transfusion haemovigilance in recipients are necessary
- Prompt preparedness for the coming years is essential

Lessons learnt

- The WNV outbreak in 2011 is **less "wild"** in comparison with 2010, but it is **more widely spread** towards South
- For the avoidance of losing high numbers of blood donors we **relaxed the deferral criterion** and instead we introduced NAT testing for all visitors of the affected areas of Athens and Thessaloniki
- The Action Plan for blood safety including an enhanced epidemiological surveillance and haemovigilance **has protected transmission of the disease** with blood without significant impact on blood supply

WNV and blood safety

Preparedness Plan 2012

Greece is coordinating the EU Working Group
Italy, France, Romania
in cooperation with ECDC and EBA

Teleconference 23 January 2012

Meeting of the Competent Authorities on Blood and Blood Components 19-20 April 2012, Brussels

Measures for the protection of blood safety against malaria in Greece 2009-2011



Measures for the protection of blood safety

General measures (temporary deferral criteria) Directive 2004/33/EC

- Persons who have lived in a malaria area for a continuous period of 6 months or more at any time in life
- Individuals who have lived in a malarial area within the first five years of life: 3 years following return from last visit to any endemic area, provided person remains symptom free; may be reduced to 4 months if an immunologic (Elisa or IFAT) or molecular genomic test (PCR) is negative at each donation
- All other persons who have visited a malaria endemic area without reporting any clinical symptoms consistent with malaria should be tested

- 50 -

Measures for the protection of blood safety

General measures (temporary deferral criteria) Directive 2004/33/EC

- Individuals with a history of malaria: 3 years following cessation of treatment and absence of symptoms. Accept thereafter only if an immunologic (Elisa or IFAT) or molecular genomic test (PCR) is negative
- Asymptomatic visitors to endemic areas: 6 months after leaving the endemic area unless an immunologic (Elisa or IFAT) or molecular genomic test (PCR) is negative
- Individuals with a history of undiagnosed febrile illness during or within six months of a visit to an endemic area: 3 years following resolution of symptoms; may be reduced to 4 months if an immunologic (Elisa or IFAT) or molecular test (PCR) is negative

Measures for the protection of blood safety

Specific measures for the areas with cases of Malaria

- Suspension of blood sessions in the affected areas and surrounding agricultural villages within a radius of 10 km for a period of six months

This distance criterion is based on the mosquito's flying capacity which is estimated 5 kilometres

- Temporary deferral from blood donation of asymptomatic persons residing or working in the above areas for a period of six months
- Temporary exclusion from blood donation of Greek citizens with family history of malaria
- PCR and EIA testing for malaria, if appropriate

Haemovigilance measures

- Identification of implicated donors in cases of post transfusion malaria
- This measure is necessary for the elimination of the risk of malaria re-introduction in previous endemic countries/areas and for preventive additional transfusion associated cases.

Source: SKAE

Surveillance in blood transfusion

- Continuous cooperation has been established with the Reference Laboratory for Parasitic Diseases of the National School of Public Health
- PCR and serological testing of 439 blood units collected in Lakonia and in Marathon and Kalivia of Attika showed negative results

Source: SKAE

Conclusions

- The Hellenic CDC has established enhance surveillance system for malaria to **identify other potential cases** in the areas with malaria outbreak
- General and specific precautionary measures have been implemented for the protection of **blood safety**
- **The impact** of the these measures on the blood supply is **minimal**
- **No transfusion transmitted malaria case** has been reported

- 52 -

Παράρτημα 7. Παρουσίαση εντομολογικής μελέτης για το ΚΕΕΛΠΝΟ

Mosquito surveillance study, Greece 2011:
Hellenic CDC, Ecodevelopment



Spiros Mourelatos, PhD


Work meeting
National School of Public Health
Athens, 26-27/01/2012

This presentation

1. **Ecological mapping of the 50 most important wetlands of Greece for the evaluation of their productivity in mosquito larvae**
2. Distribution of Anopheles in Greece
3. Risk assessment for WNV

From the Study: "Integrated Mosquito Control in Greece".
(Hellenic CDC – Ecodevelopment, April 2011 - January 2012)

Ecological Mapping (> 50 wetlands)






22 large wetlands in red
32 small wetlands in yellow

Ecological mapping in 50% of the wetlands of the inventory of the Greek Biotope / Wetland Center (EKBY) (approx. 100.000 ha)

For 2 systems, work in progress (delta of Evros and delta of Louros)

From the Ecological to the Risk map






Ecological map: the vegetation types represent different micro-habitats with different potential for the reproduction of the three main mosquito genera.

Anopheles caspius / An. atroparvus risk map on the basis of the reproductive potential of each vegetation type for the specific species.

Anopheles risk map on the basis of the reproductive potential of each vegetation type for the specific species.

Highly productive areas for the three main mosquito genera in the 50 wetlands



Levels 2 and 3


ECODEVELOPMENT
environmental applications

Highly productive wetlands




ECODEVELOPMENT
environmental applications

Ecological mapping (wetlands Peloponisos)



ECODEVELOPMENT
environmental applications

Risk Maps (Moustos, Peloponisos)



ECODEVELOPMENT
environmental applications


- 54 -

Mosquito producing surfaces (wetlands, Peloponisos)

Περιφερειακή Σύνορα	Ονομαστική χωροταξική (ΕΠΕΚ)	Aedes caspius / Ae. detritus			Anopheles spp.			Culex spp.			Ετήσια (μετα-εποχιακή) παραγωγή αυγών (σπ.)	Ετήσια παραγωγή αυγών (σπ.)
		Επίπεδο 1 (σπ.)	Επίπεδο 2 (σπ.)	Επίπεδο 3 (σπ.)	Επίπεδο 1 (σπ.)	Επίπεδο 2 (σπ.)	Επίπεδο 3 (σπ.)	Επίπεδο 1 (σπ.)	Επίπεδο 2 (σπ.)	Επίπεδο 3 (σπ.)		
Μακεδ.	Αδ. Κορινθίας	2.711	2.177	8.363	627	3.467	9.267	13	3.964	9.267	9.707	22.056
Αττική	Α. Επαρχία	1.134	2.551	2.762	989	3.176	3.122	34	3.115	3.317	0	4.011
Πελοπόν.	Α. Επαρχία	31	1.154	2.423	889	2.039	541	0	3.464	541	0	796
Πελοπόν.	Α. Επαρχία (Νέα Κόζ)	79	974	769	241	584	601	0	846	601	0	1.094
Αργολίδα	Αδ. Παρνασσός	12	304	1.065	0	44	1.367	0	0	1.365	0	1.623
Αργολίδα	Αδ. Παρνασσός	0	54	854	0	54	952	0	37	925	0	204
Αργολίδα	Αδ. Παρνασσός	319	624	465	124	501	912	0	144	1.547	0	304
Αττική	Αδ. Παρνασσός	104	175	274	0	14	545	0	0	554	0	167
Αττική	Αδ. Παρνασσός	142	515	524	184	585	457	0	731	457	0	1.623
Μυκονο	Αδ. Παρνασσός	944	482	1.044	0	644	1.514	0	344	1.444	0	1.174
ΣΥΝΟΛΟ		5.248	8.926	19.073	2.084	11.551	19.212	36	12.706	20.505	9.707	54.792

ECODEVELOPMENT
environmental applications

Surfaces of high productivity in mosquito larvae (wetlands, Peloponisos, level 3)




ECODEVELOPMENT
environmental applications

This presentation

1. Ecological mapping of the wetlands
2. Distribution of Anopheles in Greece (collection of adults: landing rates, CO₂ traps)
3. Risk assessment for WNV


ECODEVELOPMENT
environmental applications

Sampling stations (landing rates)



ECODEVELOPMENT
environmental applications


Mosquito genera composition (landing rates)



Source: Yearly Mosquito Control Projects, Final Reports. Ecodevelopment (unpublished data)

ECODEVELOPMENT
environmental applications


Three major *Anopheles* species (rice fields, landing rates)



Source: Yearly Mosquito Control Projects, Final Reports. Ecodevelopment (unpublished data)

ECODEVELOPMENT
environmental applications


Major mosquito species (rice fields, Thessaloniki)



Source: Yearly Mosquito Control Projects, Final Reports. Ecodevelopment (unpublished data)


ECODEVELOPMENT
environmental applications

Network of CO₂ traps (2011)




ECODEVELOPMENT
environmental applications


Abundance of *Anopheles* adults (CO₂ traps): Northern Greece




Abundance of *Anopheles* adults (CO₂ traps): Southern Greece





Abundance of *Anopheles sacharovi*: Northern Greece



Abundance of *Anopheles sacharovi*: Southern Greece



- 57 -



Results on *Anopheles* adults from the network of the CO₂ traps

System (buffer zone of 5 Km)	Number of traps	Traps with <i>Anopheles</i>	Total number of samples	Total samples with <i>Anopheles</i>	Average number of total of <i>Anopheles</i> /night/trap	Comparison with the numbers of periurban used as reference value
Rice fields	24	24	197	106 (53%)	26.20	X 120
Rice fields + wetlands	23	17	54	28 (52%)	4.66	X 21
Wetlands	7	7	131	39 (29%)	1.34	X 6
Periurban*	52	36	275	34 (12%)	0.22	X 1
Total	106	84	657	207 (31%)		

Typical average landing rates (15 min, after sunset) are between 0.09 and 0.81 in regions not affected by rice fields (5 districts, 5 years, n=942) versus average values in rice fields areas between 2.06 and 7.25 (4 districts, 5 years, n=844) of slide above

* Data analysis is in progress, so as to evaluate the productivity of the different categories of the breeding sites within the periurban system (quality and quantity features of the waters in the periurban system result in low productivity in *Anopheles* larvae)

Results on *Anopheles* adults from the network of the CO₂ traps

Average number of *Anopheles* species/night/trap

System (buffer zone of 5 Km)	<i>An. sacharovi</i>	<i>An. hyrcanus</i>	<i>An. pseudopictus</i>	<i>An. claviger</i>	<i>An. plumbeus</i>	<i>An. atroparvus</i>	<i>An. maculipennis</i>	<i>An. spp.</i> (n.d.)
Rice fields	4.32 (x 86)	3.90	0.54	0.83	0	0.04	0.02	0.11
Rice fields + wetlands	1.01 (x 20)	2.37	1.12	0.08	0	0	0	0.09
Wetlands	0.25 (x 5)	0.06	0.02	0.10	0.39	0.03	0	0.03
Periurban	0.05 (x 1)	0.09	0.03	0.03	0	0.01	0	0.01

The identification of the *Anopheles* from the rice fields of Thessaloniki has not been concluded, thus the total numbers of *Anopheles* spp. do not correspond to the sum of the numbers of individual *Anopheles* species

* Comparison with the numbers of periurban used as reference value

This presentation

1. Ecological mapping of the wetlands
2. Distribution of Anopheles in Greece
3. Risk assessment for WNV (a rapid overview)

ECODEVELOPMENT
environmental applications

The procedure

Reference framework:
from "California Mosquito-borne Virus Surveillance & Response Plan"
(April 2011)
<http://westnile.ca.gov>

Data collection:
from "Integrated Mosquito Control In Greece": study (Hellenic CDC,
Ecodevelopment SA, period: April 2011– January 2012)

Goal:
Validation of the Reference framework with 5 data sets from the plain of
Thessaloniki for the construction of a decision making tool for the risk
assessment and appropriate response actions for the control of WNV

ECODEVELOPMENT
environmental applications


Reference framework

WNV Surveillance Factor	Assessment Value	Benchmark	Assigned Value
1. Environmental Conditions (3 meteorological stations)	1 2 3 4 5	1. Avg daily temperature during prior 2 weeks $\leq 14^{\circ}\text{C}$ 2. 3. 4. 5. Avg daily temperature during prior 2 weeks $> 26^{\circ}\text{C}$	
2. Relative abundance of Culex pipiens adults	1 - 5	1. Vector abundance well below average ($\leq 50\%$) 5. Vector abundance well above average ($> 300\%$)	
3. Virus infection rate in Culex (in collaboration with Vakalis et al.)	1 - 5	1. MIR = 0 5. MIR > 5.0	
4. Sentinel seroconversion (pigeons, chickens) (in collaboration with Dovas et al.)	1 - 5	1. No seroconversions in broad region 5. More than two seroconversions per flock in	
5. Human cases (source: Hellenic CDC)	3 - 5	3. One or more human infections in broad region 4. One human infection in specific region 5. More than one human infection in specific region	

Adaptation from: <http://westnile.ca.gov>. Implementation in Thessaloniki plain


ECODEVELOPMENT
environmental applications

Data collection – Surveillance factor 2: Relative abundance of Culex pipiens adults



ECODEVELOPMENT
environmental applications


Data collection – Surveillance factor 2: Relative abundance of Culex pipiens adults



No. for the other 2 counties of Thessaloniki plain (Pella, Imathia) the relative abundance of Cx. pipiens were estimated empirically

ECODEVELOPMENT
environmental applications


Data collection – Surveillance factor 3: Virus infection rate in Culex (MIR)



(in collaboration with Vakalis et al.)

ECODEVELOPMENT
environmental applications

Data collection – Surveillance factor 3: Virus infection rate in Culex (MIR)



(in collaboration with Vakalis et al.)


37 stations in Thessaloniki plain

May-August: 174.382 Culex pipiens identified coming from 37x8 samples (4 months) corresponding to an average of 600 Cx pipiens/trap/night

Human cases: date of diagnosis

ECODEVELOPMENT
environmental applications


Data collection – Surveillance factor 4: Sentinel seroconversion (pigeons)




(in collaboration with Dovas et al.)

ECODEVELOPMENT
environmental applications


Data collection – Surveillance factor 4: Sentinel seroconversion (chickens)




Risk assessment (time)




Risk assessment (time)




Risk assessment (space)




In all 10x10km cells with human cases, positive mosquito pools had been previously found




- 62 -

[illegible]

Combination of field expertise, GIS and telematics in mosquito control programs



Real time spraying monitoring using telematics



Automated general report for spraying applications

05/09/2011 12:54

Spraying report

Date from: 06/09/2011 07:40 to 06/09/2011 06:15

A/A	START	END	START POINT	END POINT	DURATION	DISTANCE (m)	FLOW (l)
TEAM:	03						
CATEGORY:	FOUR 444						
VEHICLE:	BIM 1952 HELIX						
TUESDAY 06/09/2011							
1)	7:40	7:40	M. PERSON. EVROS. P. EVROS.	M. PERSON. EVROS. P. EVROS.	1'	0.0	0.0
2)	7:46	8:00	M. PERSON. EVROS. P. EVROS.	M. PERSON. EVROS. P. EVROS.	22'	0.4	100.5
					DAY TOTAL (6/9/2011):	23'	0.4 101.1
					VEHICLE TOTAL (6/9/2011):	23'	0.4 101.1
					CATEGORY TOTAL (FOUR 444):	23'	0.4 101.1
					TEAM TOTAL (03):	23'	0.4 101.1

DETAILED...

www.bioapplications.gr


Automated detailed report for spraying applications

Microsoft Excel - Ελληνικά

VEHICLE	DATE/TIME	FLOW(m)	DURATION (min)	LATITUDE	LONGITUDE
24044 1952 HELIX	06/09/2011 7:40	0.0	21	40.942091	26.269367
24044 1952 HELIX	06/09/2011 7:40	0.0	13	40.942091	26.269367
4 03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:46	1.3	12	40.942091	26.269367
2 03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:46	1.4	13	40.942091	26.269367
2 03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:47	1.4	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:47	1.4	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:47	1.3	12	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:47	1.4	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:48	1.1	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:48	1.3	12	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:48	1.4	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:48	1.4	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:49	1.1	12	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:49	1.1	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:49	1.4	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:49	1.2	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:50	0.9	12	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:50	1.3	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:50	0.6	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:51	0.7	12	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:51	1.1	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:51	1.3	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:51	1.2	12	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:51	0.7	12	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:52	0.6	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:52	0.7	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:52	0.4	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:52	0.6	13	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:52	1.6	16	40.942091	26.269367
03M 1952 HELIX	06/09/2011 7:52	0.9	13	40.942091	26.269367

www.bioapplications.gr


SPE/LC-MS multiresidue chemical analysis



www.bioapplications.gr



Spraying validation, evaluation of spraying efficiency



www.bioapplications.gr



Sampling adults mosquitoes with CO₂ Traps




National School of Public Health



www.bioapplications.gr



Ultra low volume spraying applications in Poros and Lagina, Evros




www.bioapplications.gr



- 65 -


3 Km zone around Residential Areas in Evros Prefecture



www.bioapplications.gr




Air spraying validation, analysis and evaluation using GIS



www.bioapplications.gr



Data processing



www.bioapplications.gr



Conclusions

- ✓ Response time of field applications could be significantly decreased, thus increasing the efficiency of the control programs.
- ✓ Control of field applications obliterates the inaccurate spraying, contributing significantly to environmental protection.
- ✓ This monitoring method can reduce insect resistance to insecticides.
- ✓ We can have cost reduction of the abatement program due to improvement of the effectiveness of the applications.
- ✓ During field applications, corrective actions increase the efficiency of the spraying in rates that often reaches the amount of 50%.
- ✓ All these information are very crucial for the decision making analysis in emergency situations (Malaria, WNV).
- ✓ All these data are necessary for an Integrated Mosquito Surveillance and Control Program.

www.bioapplications.gr



Proposals

- I. **Real time recordings of spraying applications should become mandatory.** Data of this monitoring system is reliable and unimpeachable. Furthermore, field scientists are able to make immediate correcting changes which will optimize the final outcome.
- II. **Evaluate Effectiveness of control programs.** Scientists will be able to evaluate spraying applications and their effectiveness through the automated reports. These data can be used for some additional or complementary actions in order to optimize outcomes. It can also be correlated with other type of data such as, the abundance and the species of mosquitoes from each region, epidemiological data etc.
- III. **Create an Updating Surveillance Data Base.** All the information can be collected in a central data base for further processing. This data can be used for many purposes one of which could be the creation of spatial analysis maps, risk maps. All this information is very crucial for field scientists and epidemiologist in the decision making in emergency situations.
- IV. **Certified Applications.** Those records are unimpeachable. As such they can be used in order to certify the spraying application. Can also be used to draw information about the cost of the projects (especially for air applications).

www.bioapplications.gr



Thank you very much for your attention



info@bioapplications.gr

www.bioapplications.gr

- 67 -



Παράρτημα 9. Παρουσίαση σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου για την ελονοσία στην Ευρώπη



ECDC response

Rapid Risk Assessments (Aug & Oct 2011)

Missions

19-25 September 2011:

- ECDC Experts: Annick Lenglet, Wim Van Bortel

10-15 October 2011:

- ECDC Experts: Herve Zeller, Wim Van Bortel
- WHO Experts: Aafje Rietveld, Rossitza Mintcheva, Elkhon Gasimov

Meeting

17 – 18 January 2012:

- Consultation on *Plasmodium vivax* transmission risk in Europe



Outcome missions

Short term recommendations

- Early detection and appropriate treatment of cases in all areas
- Blood safety considerations

Long term recommendations

- Develop an integrated preparedness and response plan for malaria that covers all aspects surveillance, clinical management, laboratory diagnosis, entomological surveillance, vector control, communication and co-ordination
- Identification of areas at potential risk in Greece and EU
- Revise the EU directive for blood safety

- 68 -

Scope of meeting 17 – 18 January



- To review the epidemiological situation of malaria in Greece;
- To assess the risk of local *Plasmodium vivax* transmission in Europe given the recent autochthonous cases in Greece;
- To discuss, identify and propose priority actions for preparedness and response at EU and country level to prevent malaria transmission in EU Member States.

Risk of reappearance of local transmission in EU



Depends on

- Presence and abundance of local malaria vectors in Europe

Receptivity: "the abundant presence of anopheline vectors and the existence of other ecological and climatic factors favouring malaria transmission" (WHO)

- Introduction (or maintenance) of malaria parasites

Vulnerability: "either proximity to malarious areas or resulting from the frequent influx of infected individuals or groups and/or infective anophelines" (WHO)

- Contact between parasites, human beings and potential vectors in an ecological and climatic favourable context

⇒ Transmission is possible in EU

Risk of reappearance of local transmission in EU



Depends on

- Presence and abundance of local malaria vectors in Europe

Receptivity: "the abundant presence of anopheline vectors and the existence of other ecological and climatic factors favouring malaria transmission" (WHO)

- Introduction (or maintenance) of malaria parasites

Vulnerability: "either proximity to malarious areas or resulting from the frequent influx of infected individuals or groups and/or infective anophelines" (WHO)


- Contact between parasites, human beings and potential vectors in an ecological and climatic favourable context

⇒ Transmission is possible in EU

Mapping areas of malaria suitability in Greece to support assessment and response



Non-linear discriminant analysis (NLDA)



Priority actions for preparedness and response at EU and country level



To identify, discuss and propose priority actions for preparedness and response to cope with malaria transmission in the EU

The meeting will address following points related to:

- Identify for each 'aspect' what can/should be done, complete and prioritise these action points for countries at risk and for the EU level;
- Identify actions specific for the EU malaria context (if any);
- Identify gaps and needs to develop such a plan.

Priority actions for preparedness and response at country level



	Areas at risk	Areas with sporadic locally acquired malaria cases	Areas with outbreak of locally acquired malaria cases
Access to health care			
Clinical awareness & management			
Laboratory diagnosis and EQA			
Surveillance			
Coordination and preparedness plan			
Update entomological knowledge			
Outbreak / case investigation			
Vector control			

▪ Indoor residual spraying

▪ Long Lasting Insecticidal Nets

The magic bullet

Update of entomological knowledge



- Vector distribution
- Vector biting behaviour
- Vector resting places



- Insecticide resistance status

Bio-assay



Vector control – Indoor residual spraying



- WHO methods & recommendations:
 - Insecticides
 - Concentration
 - Equipment
- Registration of products
- Timing & frequency
- Community involvement
- Independent evaluation



Vector control – Long Lasting Insecticidal nets



- WHO methods & recommendations:
 - Long-lasting insecticidal nets
- Registration of products
- Distribution strategy
- Timing
- Community involvement!
- Independent evaluation



Priority actions for preparedness and response at EU level



- Generic preparedness plan for vector-borne diseases
- EQA network for malaria laboratory diagnosis
- Identification of areas at potential risk for local malaria transmission in EU
- Revise the EU directive for blood safety
- Malaria impact and priority

Final considerations



- Timely planning of actions (not for one year only)
- Independent evaluation of actions
- Community involvement

ECDC

- Support Greece where possible
- Malaria working group at ECDC
- Close collaboration with WHO



Acknowledgement



Hellenic Centre for Disease Control and Prevention, Greece

WHO Euro & WHO headquarters and

European Centre for Disease Prevention and Control, Sweden

- Emerging and vector-borne disease program
- Health Impact Section
- Response section
- Malaria Working Group

- 72 -



www.ygeia-pronoia.gr

Με την
συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης




ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

www.epanad.gov.gr



www.espa.gr

Παράρτημα 10. Παρουσίαση για τις νέες εξελίξεις σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας



Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria
Kick-off Meeting
Athens 26-27th January 2012

**MALARIA LABORATORY DIAGNOSIS:
an overview**

Philippe Gillet
Institute of Tropical Medicine
Department of Clinical Sciences
Unit of Tropical Laboratory Medicine
pgillet@itp.be

Malaria diagnosis : what is needed?


- Parasite-based diagnosis essential
 - Malaria Y/N
 - Species
 - Parasite density
 - Stages/Pigment in White blood cells (signs of severity)
- Post treatment follow-up

MALARIA DIAGNOSIS:

- 1 (Clinical diagnosis).
- 2 Detection of parasites (microscopy).
- 3 Detection of parasite antigen (RDTs or ELISA).
- 4 Detection of parasite DNA (or RNA) (PCR).
- 5 Detection of specific antibody.
- 6 Detection of other markers

6a. Detection with haematology analyzers

- Thrombocytopenia
- Anaemia




- Malaria pigment (hemozoin) Phagocytosed by neutrophils and monocytes.
- Depolarization of laser light

- 73 -



6a. Detection with haematology counters



Cell Dyn 3200 (Abbott)... atypical depolarisation

Plot suggestive for malaria pigment when

- Monocytes above eosinophil/neutrophil threshold line
- Eosinophil population abnormally distributed and widely scattered



6a. Detection with haematology counters



Test characteristics (34 months)

Atyp Dep \ TF	+	-	Total
+	267	173	440
-	150	4778	4928
Total	417	4951	5368

Sensitivity = 64,2 %

PPV = 60,7 %

Specificity = 96,5 %

NPV = 97,0 %

Sensitivity P.m. = 76,9 %; P.v. 72,5 %; P.f. = 63,2; P.o. = 56,3

6a. Detection with haematology counters



- In 34 months 107 extra thick films (non-requested TF) were made.
 - 7 extra malaria cases were picked up.
 - 2 *P. malariae*; 3 *P. falciparum* gam and 2 *P.f* trof < 1000 (6 of them were also picked up by RDT).
 - The 100 negative samples were also negative with rapid tests

6a. Malaria detection with haematology counters



Comparison of Results From the Present Study for Detecting Malaria With Other Automated Hematology Instruments or Test Reported in the Literature*

Instrument/Test	Sensitivity (%)	Specificity (%)	Author
CD3500, Abbott, Santa Clara, CA	95	88	Hanscheid et al ¹
CD3200, Abbott	92.5	96.7	Scott et al ²
CD3700, Abbott	88.4	97.1	Scott et al ²
CD3000, Abbott	88.0	97.2	Gubisch et al ³
CD4000, Abbott	80.2	87.3	Scott et al ²
Gen S, Beckman Coulter, Miami, FL	96.0	82.5	Fourcade et al ⁴
Gen S, H, 750, Beckman Coulter	Malaria factor: 98; algorithm: 98	Malaria factor: 94; algorithm: 95	Present study

C. Briggs, A. Da Costa, L. Freeman, I. Aucamp, B. Ngubeni, S. Machin (2006). Development of an automated malaria discriminant factor using VCS technology. Am. J. Clin. Pathol. 126, 691-698.

Authors	Test (instrument)	Sensitivity (%)	Specificity (%)
Scott et al. (2003)	Depolarization analysis (Abbott CD4000)	80.2	87.3
Gubisch et al. (2003)	Depolarization analysis (Abbott CD3000)	48.6	96.2
Krimer et al. (2001)	Depolarized side scatter - two wavelengths (Cytoscan; MclFlow)	92	100
Krimer et al. (2001)	Correlated side scatter - two wavelengths (Cytoscan; MclFlow)	95	94
Hanscheid et al. (2001)	Depolarization analysis (Abbott CD1500)	95	88
Mendelsohn et al. (1999)	Depolarization analysis (Abbott CD3500)	72	96
Fourcade et al. (this study)	Analysis of column positional parameters (Coulter GEN.S)	96.8	82.5

C. Fourcade, M.J.C. Casbas, H. Belaouni, J.J.D. Gonzales, P.J.J. Garcia, M.A.E. Pepio (2004). Automated detection of malaria by means of the haematology analyser Coulter® GEN.STM. Clin.lab.Haem. 26, 367-372.

- 74 -

6a. Malaria detection with haematology analyzers

ADVANTAGES

- FBC automated routinely performed.
- Low init-cost once installed
- Potential to detect cases where no clinical suspicion of malaria.


DISADVANTAGES

- Quantification ...
- Species differentiation +/-?
- Persists for 2-3 weeks after cure.
- High initial and maintenance cost
- Sensitivity ...
- Specificity ...

→ Not for diagnosis.

→ Pre-screening for unsuspected patients in a travel clinic ?

6b. Magneto-Optical Biosensors for Malaria Diagnosis (MOT)



"Although MOT sensitivity and specificity are currently not yet at a competing level compared to other diagnostic test, such as PCR and RDTs, it has a potential to rapidly screen patients for malaria in endemic as well as non-endemic countries"

<http://www.malariajournal.com/content/9/1/207>

MALARIA DIAGNOSIS:

- 1 (Clinical diagnosis).
- 2 Detection of parasites (microscopy).
- 3 Detection of parasite antigen (RDTs or ELISA).
- 4 Detection of parasite DNA (or RNA) (PCR).
- 5 **Detection of specific antibody.**
- 6 Detection of other markers

5. Antibody detection

- IFAT (indirect fluorescence Antibody Test),



- ELISA (Diamed) MSP1 (P.f.) and CSP (P.v)

<http://www.malariajournal.com/content/6/1/19>

- (RDTs)



- 75 -

5. Antibody detection

ADVANTAGES

- Measure prior exposure.
- Blood transfusion (non endemic settings).

DISADVANTAGES

- No detection of current infection.
- Specificity.
- Time consuming.
- Expertise required.
- Required equipment.
- Costs.
- Remains positive for 6 months up to 2 years.

- Not for diagnosis.
- Blood bank and epidemiology

MALARIA DIAGNOSIS:

- 1 (Clinical diagnosis).
- 2 Detection of parasites (microscopy).
- 3 Detection of parasite antigen (RDTs or ELISA).
- 4 Detection of parasite DNA (or RNA) (PCR).
- 5 Detection of specific antibody.
- 6 Detection of other markers

4. PCR (DNA detection) summary

Step 1: DNA EXTRACTION



Step 2: PCR MIX



- ✓ buffer
- ✓ nucleotides
- ✓ primers & probe
- ✓ DNA polymerase
- ✓ DNA

Step 3: PCR REACTION




- ✓ denaturation (95°C)
- ✓ annealing (60°C)
- ✓ elongation (60°C-72°C)

4. PCR Signal detection

- "Classical" way: GEL electrophoresis (after the end of the PCR reaction)





* Clinical Microbiology and Infection 10.1111/j.1469-0691.2010.03344.x

3. Antigens targeted by currently available RDTs :

- **HRP-2** Histidine Rich Protein-2, protein produced by trophozoites and young (not mature) gametocytes of *P. falciparum*. Persists for up to 43 days after successful treatment.
- **pLDH** Parasite Lactate DeHydrogenase produced by asexual and sexual stages of malaria parasites (viable parasites). Distinction possible between iso-enzymes from *P. falciparum*, *P. vivax*, pan species and non falciparum species. Does not persist after successful treatment.
- **Aldolase** of pan-malarial antigens that are present in all four species of *Plasmodium*. Does not persist after successful treatment.

3. Antigens targeted by currently available RDTs :

	HRP-2	pLDH	Aldolase
<i>P. falciparum</i> specific	+	+	
<i>P. vivax</i> specific		+	
Pan specific		+	+
Non falciparum <i>Plasmodium</i>		+	

≈ 60 manufacturers
≈ 200 different RDTs

2009 : ≈ 90.000.000 tests produced



Cassettes

Two, three and four-band

RDTs : Test characteristics

Sensitivity : *P. falciparum* > *P. vivax* >> *P. ovale*/*P. malariae*

HRP-2 (SD Bioline / Carestart):

- P.f. >100/μl : > 95%
- Prozone

pLDH Pv (SD Bioline):

- 88%
- P.v. >500/μl : 95 %

pLDH pan (SD Bioline / Carestart) :

- P.v. : 78 %; P.o. : 20%; P.m. : 30%
- P.v. >500/μl : 90 %

Specificity : >97 %



HRP-2 / pLDH

AVANTAGES

- Rapid (< 15 minutes).
- No (little) expertise required.
- No equipment required.
- Full blood.
- Detection of (*P. falciparum*) sequestered parasites.
- Sensitivity +/- good for *P. vivax*.
- +/- species differentiation.
- Antigen can persist (**only**) for up to 1 to 2 weeks after cure (pLDH).

PRICE : 2-12 €

→ adjunct to microscopy


DISADVANTAGES

- No quantification.
- Sensitivity ...lower for *P. vivax* (and *P. ovale* and *P. malariae*).
- No identification of mixed infections.
- Limited species differentiation.
- Poor detection of *P. o.* and *P. m.*
- Possible positive results for non active infections (*P.f.* gametocytes).
- Antigen (HRP-2) can persist for up to 4 – 5 weeks after cure !!!
- False negatives possible with high parasitaemia (**prozone**).
- False positives with rheumatoid factor, chronic inflammatory disease, viral hepatitis, ...


Prozone effect in malaria RDTs

Patient from Nigeria

- Microscopy :
 - P. falciparum*
 - Parasitaemia : 27.4 %
- RDTs (Binax) :
 - Plasmodium non falciparum*



<http://www.malariajournal.com/content/8/1/271>



Prozone effect in malaria RDTs in an endemic setting

Mozambique, Provincial Hospital of Tete, January - April 2010

7.543 patients suspected of malaria

- 11.6% *P. falciparum*
- 1.2% *P. falciparum* $\geq$ 4%
- 0.1% Prozone (Paracheck) (=1.2% of the positive patients)

Only HRP-2 (*P. falciparum*)



<http://www.malariajournal.com/content/10/1/166>

3. Parasite antigen detection

- <http://www.malariajournal.com/content/8/1/129>
Evaluation SD bioline P.v.
- <http://www.malariajournal.com/content/8/1/262>
Evaluation SD Bioline Pf/Pv
- <http://www.malariajournal.com/content/9/1/171>
Evaluation Carestart P.f. /pan
- <http://www.malariajournal.com/content/10/1/166>
Prozone in endemic setting
- <http://www.malariajournal.com/content/8/1/271>
Prozone in reference setting
- http://www.finddiagnostics.org/resource-centre/reports_brochures/malaria-diagnostics-report-2011.html
FIND/WHO RDTs evaluation round 1,2 and 3

MALARIA DIAGNOSIS:

- 1 (Clinical diagnosis).
- 2 **Detection of parasites (microscopy).**
- 3 Detection of parasite antigen (RDTs or ELISA).
- 4 Detection of parasite DNA (or RNA) (PCR).
- 5 Detection of specific antibody.
- 6 Detection of other markers

2. Parasites Detection (microscopy).

Malaria parasites characteristics :

- Small (few μm).
- Immobile.
- Without characteristics (in fresh smear) ...

→ MICROSCOPE (500x) 1.000x

→ STAINING

2. Detection of parasites (microscopy).

- **QBC** : Staining of the centrifuged and compressed red cell layer with acridine orange and its examination under UV light source.

QBC[®] Diagnostics
Paratens



2. Detection of parasites (QBC).

ADVANTAGES

- Sensitivity : < 5-10 parasites/ μl (100 parasites/ μl ?).
- Differentiation between active infections (asexual) / non active infections (sexual).
- Treatment follow up.

+ Detection of babesiosis, microfilaria, trypanosomes

DISADVANTAGES

- Specific equipment.
- Expertise required.
- Continuous practice needed.
- Subjective.
- Differentiation between species ?
- Quantification ?
- Determination of mixed infections ?


PRICE :

1.50 - 3.00 €

- 80 -


2. Detection of parasites (microscopy).

- QBC.
- Thin / Thick smears




Staining - Acridine

- Giemsa 3,5 %; pH 7.2 or 8; 20 min.




Thin / Thick smears: ACRIDINE (staining)




→ Fluorescent microscope

Thin / Thick smears: GIEMSA



- Detection of parasites.
- Quantification [parasitemia / μ l of blood].
- +/- species differentiation.



- Differentiation between species.
- Quantification [% infected RBC].

Thick smear if + ? → thin smear

Giemsa thin / thick smears

ADVANTAGES

- Simple equipment and supplies required.
- Sensitivity : < 5-10 parasites/ μ l (100 parasites/ μ l ?).
- Differentiation between species.
- Quantification.
- Differentiation between active infections (asexual) / non active infections (sexual).
- Detection of signs of severity
- Determination of mixed infections.
- Treatment follow up.

+ Detection and identification of babesiosis, microfilaria, trypanosomes and recurrent fevers.

→ Golden standard

DISADVANTAGES

- > 60 minutes before results.
- Expertise required.
- Continuous practice needed.
- Subjective.
- Labor intensive and time consuming.

PRICE :

0.10 - 0.35 €

Malaria diagnosis : what is needed?

Parasite-based diagnosis essential

- Malaria Y/N
- Species
- Parasitemia
- Stages/Pigment

Post treatment follow-up

- Training
- Confirmation needed
- Quality control

At night, or before expert review do not miss *P. falciparum*, especially high parasitaemias

50% of requests
60% of diagnosis
outside office hours

Expert microscopy detects 5 – 10 parasites/μl
Field microscopy detects 100 - 500 parasites/μl ?
Hospital admission recommended at 2% (5%) = 100.000/μl

Malaria laboratory diagnosis: Summary

Parasite density /μl	% of infected RBC	Parasites / microscopic field	
		Thin film	Thick film
50.000	1%	2 / 1 field	50 / 1 field
5.000	0,1%	1 / 4 fields	5 / 1 field
500	0,01%	1 / 40 fields	5 / 10 fields
100	0,002%	1 / 200 fields	1 / 10 fields
10	0,02%	1 / 2000 fields	2 / 100 fields

PCR up to 0.004 parasites/μl
Microscopy up to 2-5 parasites/μl ... IN REFERENCE.. IN ROUTINE ?

Place for RDTs... as adjunct to microscopy and PCR

Exclusion power is not high enough to rely on Malaria RDT as the only diagnostic test for ruling out malaria

RDT Pv > 90 %
RDT Pf > 95 %


Παράρτημα 11. Παρουσίαση για τις νέες εξελίξεις σχετικά με το γονοτυπικό προσδιορισμό της ελονοσίας

Genotyping - Application to *Plasmodium vivax*

Georges SNOUNOU
UMC, Malaria Unit, UMS 546




Georges Snounou - KIEL/PAO Athens 26 Jan 2012






Distinguishing Between *Plasmodium* Lines





Isoenzymes Carter 1960s	In vitro Culture Trager & Jensen 1976	PCR 1990 - Present
S Antigens Wilson 1960s	Parasite Clones Do Rosario 1981	High diversity between the parasites in an endemic area as well as between and within individuals
McAb McBride 1970s	Gene Cloning 1983 - Present	

Georges Snounou - KIEL/PAO Athens 26 Jan 2012



- 83 -






The Unpredictable Relapses

Tx	n	Same Genotype	Different Genotype
A ^s	18	12	6
A ^r	12	6	6
HA	6	1	5
AZ	4	3	1
DO	3	2	1
TE	2	1	1
AM	2	1	1
SP	2	2	0
Q	1	1	0

21 out of 50

Georgios Stroutos - KEEEL/PMO Athens 26 Jan 2012

PCR Correction of Trials Outcomes by Genotyping



Georgios Stroutos - KEEEL/PMO Athens 26 Jan 2012

Outbreak Analysis




Georgios Stroutos - KEEEL/PMO Athens 26 Jan 2012

Which Questions Can One Answer ?

- Diversity in the same person with time
- Diversity in different people
- Diversity in different places
- Diversity in different seasons
- Find the Index Case (Population)

Geographic Origin
(Local vs Introduced)

Georgios Stroutos - KEEEL/PMO Athens 26 Jan 2012



- 87 -

Παράρτημα 12. Παρουσίαση για τις δυσκολίες στον έλεγχο και τη θεραπεία της ελονοσίας σε μετανάστες



Malaria and migrants challenges

Dr Martin De Smet
Head of the MSF Malaria Working Group

Workshop, 2012 January 26-27, NSPH Athens

MSF & Malaria

- >1.300.000 patients with confirmed malaria/year (in conflict, post-conflict, refugees and displaced, ...)
- Involvement in
 - Health promotion
 - Prevention- vector control
 - Diagnostic strategies
 - Access issues
 - Treatment
- Innovative strategies – piloting
- Operational research (rapid tests, drug efficacy, delivery models, vector control interventions,...)

Migrants & Malaria: specific challenges ?

- Access of migrants to services
- Access to migrant population for diagnosis, treatment and follow-up
- Different origin: different species → adapted diagnostic tools
- Different drug resistance profiles → adapted treatment choice
- Screening: relevance, technical challenges, ethical issues
- Avoid transmission to local population? (primaquine for Pf?)
- Radical cure in case of Pv (elimination hypnozoites)
- Use of prevention / technical tools

Access

Access patients to services: "access to free treatment"

- Free "emergency care": threshold ?
- Consultation fee + cost procedures
- Availability proper tools (diagnostic, treatment) in health centers ?

Access services to patients and population ?

- Health promotion; information on services
- Diagnosis and treatment
- Follow-up after treatment
- Screening (?)

- 88 -

Diagnosis & Screening

Mobile population: need rapid "point of care" test

Diagnostic test criteria:

- *detect* the different Plasmodium species
- *differentiate* different species (→ adapted management)
 - Pf: single dose primaquine as gametocidal tt
 - Pv: Primaquine for radical cure (against hypnozoites)
- In case of screening (asymptomatic pts): need high detection rate low parasitemia levels

- Microscopy not feasible/realistic as PoC
- Rapid Diagnostic Test (RDT) HRPII + panpLDH

Combined HRPII + panpLDH tests

- **Principle:** detection antigens produced by parasite
- **3 lines (C, Pf, Pan)**
detection & differentiation *P. falciparum*, and other species (*P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*)
 - C-Line: internal Control line
 - Pf-Line (HRPII): *P. falciparum*
 - Pan pLDH-line: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. Malariae*
- **Shelf-life:** 24 months at < 40°C (SD Bioline data)
- **Reading time:** 15 min. ev extended to 30 min.
- **Note:** HRPII can remain detectable for several weeks after elimination of parasites, while the pan pLDH may remain detectable for 1 or 2 weeks.


Malaria RDT

Combined HRPII(Pf) and pan PLDH (all species).



Ex.:Positive for non P.f species

Pan line positive, Pf line negative:
P. vivax, *P. malariae*, *P. ovale* infection



Support selection of tests WHO/FIND/CDC/TDR evaluation (3R)

Detection rate – Combo

P.f./P.v. at 200 and 2000/5000 p/μl

- Carestart (G0131):
97.5%/90.0% and 100%/95%
- SD Bioline (05FK60):
92.9/**97.1** and 99.0/100.0 (Round 3)



RDT: MSF's choice (SD Bioline PfAg/pan) based on

- "Panel detection rate" (sens), especially Pf in WHO/TDR/FIND/CDC evaluation
- Heat stability
- Ease of use
- Quality Control in place at producer level
- Production capacity, continuity
- Registration in countries...

Note MSF: systematic pre-shipment lot-testing

Limitations RDT

- Low parasitemia levels can (rarely) be missed (cfr detection rate low parasitemias (200/uL) above 95 % with best performing tests)
Note: many substandard tests
- Persistent antigen (HRP2 several weeks, pLDH several days to week) → not to be used to evaluate effect of treatment
- Main issue: human error – mistakes in performing test

Common mistakes RDT

Leading to false negatives

- Incorrect quantity of blood (background not clear at 20")
- Not respecting reading time before considering as negative
- Not realizing what a "faint positive" line means
- Insufficient light etc...

Leading to false positive

- Reading too late (appearing positive line after ex. 1/2 hrs)
- Performing test within window of persistent antigens (recommendation: not < 2 weeks after treatment)

➤ Need training (MSF ppt series)

➤ MSF: supervision checklist

- 90 -

Place microscopy - PCR

- Evaluate effect of treatment (RDT not useful for this purpose)
- Confirmation and monitoring if severity
- Diagnosis during the window phase of persistent antigens HRP2/pLDH
- ?? Together with RDT can increase detection rate (marginal?)
- Microscopy: importance experience and QC

Note: Place PCR

Cambodia – 2009 survey malaria Prevalence
% positive blood samples : smear vs PCR

	TOTAL	ZONE 1 (N= 4107)			ZONE 2 (N= 5694)		
	% (N)	% (N)	Pf	Pv	% (N)	Pf	Pv
Slide	0.9 (49)	0.6 (17)	0	17	0.9 (32)	6	24
PCR	2.8 (161)	2.7 (65)	21	40	2.9 (96)	32	61

Source: CNM/Malaria Consortium

Screening ?

- Relevance (cfr MSF-I experience)?
- Cost/efficiency?
- Focus target groups: limited to vulnerable (esp pregnant, HIV+,... ?)
- All in outbreak area ? Threshold ? In case patient without travel history ?...
- Offer possibility to be tested ?
- Active screening in community ?

P. falciparum: treatment issues

- Different resistance profiles according to country of infection
 - Need treatment highest probability of success
 - Best options: Artemether-lumefantrine (alt: DHA/PPQ ?)

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS MEDICINE

Policy Forum

Assessing Antimalarial Efficacy in a Time of Change to Artemisinin-Based Combination Therapies: The Role of Médecins Sans Frontières

Jean-Paul Guthmann*, Francesco Checchi, Ingrid van den Broek, Suna Balken, Michel van Herp, Eric Comte, Oscar Bernal, Jean-Marie Kindermans, Sarah Venis, Dominique Legros, Philippe J. Guerin

WHO recommends ACT's (artemisinin based combination therapy)

Combination artemisinin derivative
(artesunate, artemether, dihydroartemisinin),
+ long acting partner:

- Artesunate-sulphadoxine/pyrimethamine
- Artesunate-amodiaquine
- Artesunate-mefloquine
- **Artemether-lumefantril**
- **Dihydroartemisinin-piperaquine**

Pf : Treatment issues (ct'd)

- Treatment failures: few % if good compliance, relapses possible after several (2-6) weeks ?
- Relevance of test (smear) to evaluate treatment success
- Curative tt to be followed by gametocidal tt ?
- DOT (cfr poor adherence documented)

Pf: Place primaquine

- Artemisinin derivatives: relatively active against young gametocytes – insufficient
- Today only **primaquine** as real gametocidal (single dose 45 mg)
- (Low) risk haemolysis in case of G6PD deficiency
- Ethical issue: very low risk hemolysis but no individual benefit (benefit to environment as it reduces risk transmission)

Adherence to treatment: MSF studies

	SIERRA LEONE (artesunate-amodiaquine.)	RCA artemether-lumefantril
PROBABLY NOT ADHERENT	28.8%	6.2%
NOT ADHERENT	22.9%	33.0%
PROBABLY ADHERENT	48.3%	60.8%



Contents lists available at ScienceDirect
Transactions of the Royal Society of
Tropical Medicine and Hygiene
journal homepage: <http://www.elsevier.com/locate/trstmh>



Successful introduction of artesunate combination therapy is not enough to fight malaria: results from an adherence study in Sierra Leone

Sibylle Gerstl^{a,*}, Sophie Dunkley^b, Ahmed Mukhtar^b, Samuel Baker^c, Jacob Maikere^d
^a Malaria Unit, University of Liverpool, UK; ^b Malaria Unit, University of Liverpool, UK; ^c Malaria Unit, University of Liverpool, UK; ^d Malaria Unit, University of Liverpool, UK

ARTEMETHER-LUMEFANTRINE (12 mg/kg LF)

Forme dispersible 5-15 et 15-25 kg

BODY WEIGHT	Day 1 Days	Day 2 Days after	Day 3 Days after
5 to less than 15 kg	1 tablet am 1 tablet pm	1 tablet am 1 tablet pm	1 tablet am 1 tablet pm
15 to less than 25 kg	2 tablets am 2 tablets pm	2 tablets am 2 tablets pm	2 tablets am 2 tablets pm
25 to less than 35 kg	3 tablets am 3 tablets pm	3 tablets am 3 tablets pm	3 tablets am 3 tablets pm
Adults & children 35 kg & above	4 tablets am 4 tablets pm	4 tablets am 4 tablets pm	4 tablets am 4 tablets pm

Dihydroartemisinin-piperaquine = Eurartesim®
(Duo-Cotexhin® : non-validé)

Validé enfants > 5 kg et > 6 mois

Body Weight	Tablet Strength	Posology
5-6 kg	Infant: 10 mg DHA / 80mg PQP	1 tablet/day for 3 consecutive days taken at the same time each day
7-12kg	20 mg DHA / 160mg PQP	1 tablet/day for 3 consecutive days taken at the same time each day
13-23 kg	40 mg DHA / 320mg PQP	1 tablet/day for 3 consecutive days taken at the same time each day
24-35 kg	40 mg DHA / 320mg PQP	2 tablets/day (o.d.) for 3 consecutive days taken at the same time each day
36 - 75 kg	40 mg DHA / 320mg PQP	3 tablets/day (o.d.) for 3 consecutive days taken at the same time each day
Over 75 kg	40 mg DHA / 320mg PQP	4 tablets/day (o.d.) for 3 consecutive days taken at the same time each day

P vivax: treatment

- Basic treatment: chloroquine (or ACT)
- "Radical cure" 14 days daily primaquine (15mg/day adult, or 0,25-0,5 mg/kg/day) to eliminate hypnozoites
 - Principle: if patient not exposed to reinfection – so indicated in Europe
 - Risk hemolysis reality
 - G6PD measurement needed
 - Alternative protocols (0,75 mmg/kg/wk, 8 wks,...)

Severe malaria

- Current treatment based on artesunate injections (IV or if not possible IM)
- Quinine: considered substandard treatment (25-33 % more mortality)

•Preparation:
add 2 ml Nabicarbonate, than 5 ml physiologic serum (IV)

•2,4 mg/kg, at 0-12-24 hrs, than 1/24 hrs until oral treatment possible (3 day ACT)



Prevention

Rationale: maximize impact transmission

- Prevent local transmission to vulnerable
- "isolate" patient, reducing transmission to environment ?

Options personal protection:

- Long Lasting Insecticide treated bednets
- Innovation: Insecticide treated dome tents

Place Indoor residual spraying ? (Collective centres...)



Long-lasting insecticide treated bednets



Photos Yentes Dome Moustiquaire



- 94 -

Some questions...


- Screening: yes/no, target group, how ?
- DOT (directly observed treatment):
1° dose ? 3 doses ? Primaquine ? By whom?
- Control (smear) after treatment: how, when ?
Strategy in case of treatment failure ?
- Place microscopy & PCR ?
- Prevention: target population ?
- Availability essential tools ?
- Access issues ?



Thank you for your kind attention !

Dr Martin De Smet
Head of the MSF Malaria Working Group

martin.de.smet@brussels.msf.org



Life Cycle Anopheles



Gonotrophic cycle
meal-maturation – oviposition-
meal
cycle 2/3 days (°C)
7 – 10 cycles

Lifespan
Can be 20 days-1 months
average 10 days

- 95 -

Vector Control Activities Methods

	Density of vector	Contact vector-person	Survival chance vector
Reduction of parameter	20 %	20 %	20 %
Control Method	Larviciding Environmental control Space spraying	Non-impregnated nets Screening houses Repellents Protective clothing	LLIN IRS Zooprophylaxis
Impact in reduction of Vectorial capacity	20 %	36 %	98 %

Adapted from Lutte Contre Les Vecteurs, M. Coosemans, 1997

Screening for G6PD deficiency

Quantitative: Gold standard

Qualitative: NADPH Spot test reliable, specific, can be 'home made'.
Will detect 30% activity, e.g. G6PD Kalyan-Kerala.
Higher levels not associated with acute haemolytic anaemia.
Numerous kits on the market. **Trinity Biotech**
New kit by AccessBio (New Jersey, USA), CareStart, available in 2 years

DNA analysis: PCR based.

Haemoglobin card/Guthrie spot test: NADPH spot test, DNA-Haemoglobinopathies

Treating Malaria II

Eliminating hyponozoites : 210-420 mg Primaquine : 7 days to 8 weeks

Gametocytocide requires only single dose 45 mg.

USA army : 15 mg daily for 14 days or 45 mg weekly for 8 weeks to G6PD deficient subjects.

Treating Malaria III

Little alternative to primaquine: 3 options

1. Administer primaquine full dose-knowing there will haemolytic attack and keep patient under medical supervision.
2. Administer primaquine at reduced dose (15mg/day) for longer period:
Risk not eradicating the parasite.
3. Treat acute *P. Vivax* attack-several drugs and give up on eradication in G6PD deficient subjects.

- 96 -

Summary

Treating malaria without screening for G6PD deficiency is dangerous

Females: haemolysis severity greatly reduced
Spot test will detect heterozygotes, but not those with >70% red cells with normal activity-but in these women the haemolysis is diminished.

Haemolysis minimum in subjects with >30% of normal G6PD activity.


Need to know weigh risk of AHA with single 45mg dose

NADPH spot test: StartCare-available in 1-2 years.

Malaria: RDT

Molecular

Reference labs/Database



Monitoring mosquito populations (exploring fauna)

- Focus on *Anopheles* spp. fauna
- Obtain samples from operational projects
- Adult trapping – larval sampling
 - Preliminary comparison of different traps
- Quality control of morphological identification

Monitoring mosquito populations (spatial and temporal dynamics)

- Two areas
 - Thessaly
 - Skala, Lakonia
- Larval sampling – adult trapping
- Follow specific sampling plan and spatial dispersion of sampling points

Genetic structure and infection rates

- *Culex pipiens* complex
- Molecular analysis of samples collected from different areas
- Define infection rates

Database development

- Historic data
 - Extensive and exhaustive literature research
- Enter data of HCDC
- Timely management of ESPA project

Malaria vector behavior and biology

- Aim
 - Identify the potential malaria vectors in a specific area (Skala, Lakonia)
 - Adult resting sites
 - Overwintering
 - Biting time
 - Anthropophilic behavior
- Methods
 - Adult collections (indoor captures, aspirator collections)
 - Human bait (human landing counts, chemoprophylaxis)
 - Alternatively, CDC light traps

Evaluation of control programs

- Independent evaluation
- Evaluation at every single step
- Assess impacts on environment or non target organisms

- 100 -

Παράρτημα 14. Συμπεράσματα από την ομάδα εργασίας 2

Ομάδα εργασίας 2

Ιός του Δυτικού Νείλου σε άγρια πτηνά,
ιπποειδή και οικόσιτα πτηνά

Συντονιστές: Χ. Μπιλλίνης
Δ. Τόντης

Συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας

- Μπιλλίνης Χ.
- Τόντης Δ.
- Γιαννακόπουλος Αλ.
- Μπίρτσας Π.
- Αθανασίου Λ.
- Δόβας Χ.
- Δουγάς Γ.
- Σπύρου Β.
- Βαλιάκος Γ.
- Τουλούδη Α.
- Ιακωβάκης Χ.
- Δούκας Δ.

State of the art για τον ιό του ΔΝ

□ Πηγές που θα χρησιμοποιηθούν

□ Σχεδιασμός "state of the art"

- Βασικές ενότητες
- Πεδία που θα καλύπτονται
 - Έντομα, πτηνά, ιπποειδή, άνθρωποι
 - Τρόποι μετάδοσης
 - Τρόποι διάγνωσης
 - Θεραπεία
 - Μέτρα προστασίας

Μελέτη οικολογίας οικόσιτων και άγριων πτηνών δυσνητικών φορέων του ιού του ΔΝ

□ Δειγματοληψία


- Παγίδες (mist nets, Australian traps, Larsen traps, others)
- Αριθμός δειγμάτων (blood and/or tissues 80-100 wild birds per year, 30 equines)
- Αριθμός δειγμάτων (blood only from pigeons 300 per year)
- Ποια πτηνά θα αφορά (Song thrush, Mallard, Magpie, Quail, Teal)

□ Εργαστηριακός έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του ιικού φορτίου


- Μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί (PCR, RT-PCR)

□ Κατανομή του πτηνού εντός της επιλεγμένης περιοχής Central Macedonia, Thessaly, Attiki

- Συχνότητα εμφάνισής του ιού
5% in birds collected



Migratory routes of Mallard in Europe



Australian trap



Australian trap



- 102 -

Larsen trap



Mist nets



Μελέτη οικολογίας οικόσιτων και άγριων πτηνών δυνητικών φορέων του ιού του ΔΝ

- ❑ Προσδιορισμός φύλου και ηλικίας του πτηνού
In mallards, quail and teals
- ❑ Συλλογή δεδομένων για τη σύνθεση και την αφθονία των ειδών της πτηνοπανίδας
Observation and record of different species during sampling period
- ❑ Επιτήρηση και έλεγχος του ιού
 - Τρόποι (Passive and Active surveillance)
 - Μέσα (Blood/tissue collection, serology, molecular methods)

Ανίχνευση, ποσοτικός προσδιορισμός και τυποποίηση του ιού του ΔΝ σε άγρια πτηνά καθώς και σε ιπποειδή

- ❑ Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού του ΔΝ στα πτηνά και στα ιπποειδή
(ELISA, IFAT, PRNT)
- ❑ Μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού του ΔΝ στα πτηνά και στα ιπποειδή και
(PCR, RT-PCR)
- ❑ Τυποποίηση και το γενετικό προσδιορισμό των στελεχών που θα ανιχνευθούν
(Sequencing)

Μελέτη της παθογόνου δράσης του ιού του ΔΝ σε άγρια και οικόσιτα πτηνά καθώς και σε ιπποειδή

□ Παθολογοανατομική μελέτη ζώων

- Ποια είδη
(Not autolysed samples, from equines and birds)
- Αριθμός δείγματος
(4 equines, 10 birds per year)
- Μέθοδος
Necropsy, histology


Μελέτη ορομετατροπής οικόσιτων πτηνών

□ Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού του ΔΝ σε οικόσιτα πτηνά

- 5 pigeons per pigeon lofts (60)
- Αριθμός δειγμάτων (300 per year)
- Μέθοδος (ELISA)

□ Μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού του ΔΝ σε οικόσιτα πτηνά


- Μέθοδος (PCR, RT-PCR)



BIRD DATA

1. The coordinates of the bird samples will be determined

- 104 -



Παράρτημα 15. Συμπεράσματα από την ομάδα εργασίας 3

Working Group 3

Malaria and West Nile Virus (WNV)

Laboratory diagnosis in humans
Seroepidemiological survey for West Nile Virus in samples from different parts of Greece

Coordinators: N. Vakalis
A. Papa

WNV in human samples

□ Methods

- Price of the IgG and IgM kits 570 Euros per kit
- Aprox. 7 Euros per sample when worked altogether. When individual: 40 Euros each.
- Time to the result: 24 hours
- Sensitivity: according to manufactures and our experience: very good.

Commonly used methods: ELISA Focus IgM, IgG.

□ Advantages and disadvantages

Strengthening program of the WNV diagnostics

Diagnostics on WNV

- Serological (mainly) ELISA
- Molecular (RT-PCR, Real Time PCR).
- Avidity for past infections.

Extras in AUTH:

- Test for cross-reactivity with other flaviviruses (Dengue virus, TBEV)
- Neutralizing antibodies.
- IFA specific for lineage 1 and lineage 2.
- Isolation in cell culture.
- Molecular characterization of whole genome, phylogenetic analysis

Seroepidemiological study for WNV

□ Laboratory method

- ELISA Focus IgG
- Price 6-7 Euro per sample
- Sensitivity: high according to manufacturers and our experience

□ Sampling

- This will be in the frame of Thalys project
- Additional questions: former travel in endemic areas in Greece or abroad – probable vaccination for flaviviruses (Yellow fever, JE)

- 107 -

Seroepidemiological study on WNV

□ Analysis of data

- SPSS, STATA. According to age, residence, occupation, travel to endemic areas

□ Global epidemiology on WNV

- Thematic maps including:
 - Data of seroepidemiological data
 - Data on mosquitoes
 - GIS imaging in collaboration with other working groups

□ Distribution of the virus: Probably in new areas. Peloponnese?

□ Improving of the diagnosis of the disease: Early warning. Early report to public Health (KEELPNO)

Malaria in human samples

□ Methods:

- Microscopical examination
 - thick films
 - thin films
- RDTs (SD Bioline, Carestart), LOT Number of reagent
- Sensitivity 95%, cost (to be evaluated)
- **Most common methods** → microscopy & RDTs
- **Advantages and disadvantages** → microscopy: needs expertise, RDTs: fast
- **Molecular detection in the frame of screening of immigrants:**
All positive human cases (hospitals & screening of immigrants) to be sent to the Malaria Reference Laboratory for PCR confirmation
- **Molecular Genotyping:** Ongoing project

Strengthening program of the Malaria diagnostics in all the country

- Already we implemented training project in Lakonia
- We are going to prepare further 2-day training meetings in: Thessaloniki, Larissa, Kalamata and Athens (4-day meeting)
- Also we will organize an 1-day satellite training meeting in Athens, during the 27th Congress of Biopathology

Strengthening program of the reference centers

- Laboratory reagents for molecular diagnosis & genotyping (sequencing)
- Participation in external quality control programs (cooperation probably with Belgium, P.G. and other European program under the supervision of ECDC) and implementation of internal QC (local hospitals & health care units)

Seroepidemiology for malaria

- After a lot of discussion we propose the implementation of a small –scale study (about 50 positive malaria cases of 2011 and 50 negative controls)

- 109 -

Παράρτημα 16. Συμπεράσματα από την ομάδα εργασίας 4

Ομάδα εργασίας 4

Ελονοσία και ιός του ΔΝ / Malaria & WNV

Επιτήρηση σε ανθρώπους / Surveillance in humans
Διάγνωση και θεραπεία / Diagnosis & Rx
Ενημέρωση κλινικών ιατρών / HCW education

Συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας

- Ιωάννης Τσελέντης
- Γεώργιος Σαρόγλου
- Σωτήρης Τσιόδρας
- Αθανάσιος Τσακρής
- Αγορίτσα Μπάκα
- Αλεξάνδρα Βερναρδάκη
- Θεανώ Γεωργακοπούλου
- Κατερίνα Λιόνα
- Μίνα Μπαλάσκα
- Νίκος Μπιτσόλας
- Βάλια Παπανικολάου
- Δανάη Περβανίδου

Δικτυακή πύλη ΕΣΠΑ (οριζόντια δράση σε όλες τις ομάδες)

- Δημιουργία δικτυακής πύλης, φιλοξενία από το ΚΕΕΛΠΝΟ / Website-hosted by ΚΕΕΛΠΝΟ
- Περιεχόμενο / Content
 - Ενημερωτικό και ψηφιακό υλικό για διάγνωση και θεραπεία
 - Κατευθυντήριες οδηγίες διάγνωσης – θεραπείας, φάρμακα
 - Στοιχεία επικοινωνίας φορέων και δικτύου
 - Εκπαιδευτικό υλικό, διαχωρισμένο με βάση τις ομάδες χρηστών
 - Εκπαίδευση - διδακτικό course (E-Learning) για επαγγελματίες υγείας
 - Ασκήσεις - workshops
- Χρήστες / Users
 - Ευρύ κοινό / Public
 - Μετανάστες / Migrants
 - Παιδικός πληθυσμός / Children
 - Επαγγελματίες Υγείας / HCW
 - Διαφοροποιημένη πρόσβαση μέσω κωδικού (Access via registration -password)
 - Βεβαίωση – certification για κλινικό έργο και εργαστηριακό έλεγχο (e-learning courses)
- Τα δεδομένα θα δημοσιοποιούνται κατόπιν έγκρισης – εξουσιοδότησης από αρμόδιο συντονιστικό όργανο

Δημιουργία δικτυακής πύλης State of the art για την ελονοσία

□ Πηγές που θα χρησιμοποιηθούν / Sources

□ Σχεδιασμός "state of the art"

- Βασικές ενότητες
- Πεδία που θα καλύπτονται
 - Χάρτες επιτήρησης / Maps
 - Τρόποι διάγνωσης / Dx pathway
 - Σημεία αναφοράς για διάγνωση, επιβεβαίωση / Points of reference-testing/confirmation
 - Τρόποι Θεραπείας, σπάνια φάρμακα / Rx-not commercially available drugs
 - Ενημερωτικό υλικό: κοινό / μετανάστες (εικονογραφημένο) / επαγγελματίες υγείας / παιδικός πληθυσμός / Educational campaign-illustrated material

Ενίσχυση της επιτήρησης της ελονοσίας σε ανθρώπους

- Υποχρεωτική δήλωση (υπάρχουν Δελτία του ΚΕΕΛΠΝΟ)
- Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης Αυτόχθονου Κρούσματος Ελονοσίας
- Κοινός χάρτης με δεδομένα από ανθρώπους, διαβιβαστές και περιβάλλον
/ Common maps with GIS data from humans, vectors
- Κατηγοριοποίηση περιοχών της χώρας σε 3 επίπεδα – risk stratification levels according to migrant country of origin and history of malaria
 - Level 0 – εργατικό δυναμικό μεταναστών από ενδημικές στην ελονοσία χώρες
 - Level 1 – εργατικό δυναμικό μεταναστών από ενδημικές στην ελονοσία χώρες, περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου ή/και ιστορικό ελονοσίας της περιοχής
 - Level 2 – όλα τα παραπάνω και σποραδικά κρούσματα ή τουλάχιστον ένα αυτόχθονο κρούσμα τα τελευταία 3 χρόνια
 - Level 3 – συρροή ή συνεχή μετάδοση της νόσου τα τελευταία 3 χρόνια
- Χρήση υπάρχοντος δικτύου Εργαστηριακής Επιτήρησης ΚΕΕΛΠΝΟ
/ Use of current lab network of ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενίσχυση της επιτήρησης των νοσημάτων σε ανθρώπους

Ελονοσία (Level 0)

- Επικοινωνία με Περιφερειάρχη και Νομιάτρο προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση μεταναστών / εργατών κατά χώρα προέλευσης / Mapping of migrants -workers
- Ενημέρωση των ιατρών για την κλινική διάγνωση και θεραπεία της ελονοσίας – Clinical physician education campaign

Ενίσχυση της επιτήρησης των νοσημάτων σε ανθρώπους

Ελονοσία (Level 1)

- Ευαισθητοποίηση ιατρών και νοσηλευτών μέσω επιστολής/ημερίδας σε παθολόγους – μικροβιολόγους
- Ενεργητική Επιτήρηση (τηλεφωνική επικοινωνία σε δίκτυο ιατρών ή νοσηλευτών λοιμώξεων) – μηνιαία
 - Εισαγόμενο κρούσμα: σε καθυστέρηση διάγνωσης διερεύνηση περιβάλλοντος (**να οριστεί η ακτίνα**)
- Επικοινωνία με Περιφερειάρχη και Νομιάτρο προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση μεταναστών / εργατών κατά χώρα προέλευσης

Ενίσχυση της επιτήρησης των νοσημάτων σε ανθρώπους

Ελονοσία (Level 2 – Αττική, Βοιωτία, Έυβοια)

- Επικοινωνία με Περιφερειάρχη και Νομιάτρο προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση μεταναστών / εργατών κατά χώρα προέλευσης
- Ενεργητική Επιτήρηση – τηλεφωνική επικοινωνία ανά εβδομάδα
- Ενεργητική Ανεύρεση Κρούσματος (Active Case Finding)
 - Ενεργητική Ανεύρεση Κρούσματος – διερεύνηση περιβάλλοντος επιβεβαιωμένου κρούσματος (**να οριστεί η ακτίνα**)
- Εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων (χρήση RTD και μικροσκοπικής μεθόδου).
- Θεραπεία μεταναστών (συμπτωματικού και μη) σύμφωνα με το Θεραπευτικό Πρωτόκολλο μεταναστών

Ενίσχυση της επιτήρησης των νοσημάτων σε ανθρώπους

Ελονοσία (Level 3 – Λακωνία)

- Επικοινωνία με Περιφερειάρχη και Νομίατρο προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση μεταναστών / εργατών κατά χώρα προέλευσης
- Ενεργητική Επιτήρηση – τηλεφωνική επικοινωνία ανά εβδομάδα
- Ενεργητική Ανεύρεση Κρούσματος (Active Case Finding)
- Εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων (χρήση RTD και μικροσκοπικής μεθόδου).
- Θεραπεία μεταναστών (συμπτωματικοί και μη) σύμφωνα με το Θεραπευτικό Πρωτόκολλο μεταναστών

Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι/Diagnostic algorithms

Ελονοσία

- Σε συμπτωματικό ασθενή ή με συμβατό κλινικό - επιδημιολογικό ιστορικό
 - Κέντρο Υγείας, Κέντρο Υποδοχής, Εξωτερικά Ιατρεία πρωτοβάθμιων φορέων υγείας και ιδιωτικά ιατρεία
 - ↓
 - Έλεγχος με RDT, επί θετικού αποτελέσματος έλεγχος με μικροσκοπική εξέταση και επί θετικού αποστολή αίματος στο Κέντρο Αναφοράς. Επανελέγχος σε 24 ώρες, όπου κρίνεται αναγκαίο, επί αρνητικού αποτελέσματος.
 - Εξωτερικά Ιατρεία και ΤΕΠ Νοσοκομείων
 - ↓
 - Μικροσκοπική εξέταση ή και RDT ανάλογα με την εξειδίκευση του προσωπικού και επί θετικού αποστολή αίματος στο Κέντρο Αναφοράς.

Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι /Diagnostic algorithms

Ελονοσία

- Σε ασυμπτωματικό ασθενή (μαζικός έλεγχος ή διερεύνηση επαφών κρούσματος)
 - Έλεγχος με RDT(??), επί θετικού αποτελέσματος έλεγχος με μικροσκοπική εξέταση και επί θετικού αποστολή αίματος στο Κέντρο Αναφοράς. Η θέση της μεθόδου PCR
- Σε αποτυχία θεραπευτικής αγωγής
 - Επανελέγχος μικροσκοπικής εξέτασης αίματος με εκτίμηση της παρασπαιμίας
 - Μελέτη ανοχής πλάσματος στα ανθελονοσιακά στο Κέντρο Αναφοράς.
 - Τυποποίηση πλάσματος και έλεγχος συν-λοίμωξης στο Κέντρο Αναφοράς.

Θεραπευτικοί Αλγόριθμοι/Therapeutic algorithms

Ελονοσία

- Εισαγόμενα κρούσματα σε εργάτες μετανάστες
 - Ομαδοποίηση χώρων προέλευσης μεταναστών ανάλογα με το πλάσμιδίο και την ανοχή
 - Φαρμακευτική αγωγή στις πύλες εισόδου (Έβρος) και στις περιοχές Level 2,3 με βάση την ομαδοποίηση της χώρας προέλευσης
 - Κατευθυντήριες οδηγίες ιστοσελίδας ΚΕΕΛΠΝΟ
 - Συνεχής τροποποίηση σχημάτων ανάλογα με τις διεθνείς οδηγίες
 - Παραμονή για 72 ώρες τουλάχιστον σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών για ολοκλήρωση της θεραπείας
 - Σε περίπτωση Viraex παραμονή επί 14 ημέρες ή παραπομπή σε άλλη υπηρεσία υγείας
 - Χορήγηση πιστοποιητικού θεραπείας

Θεραπευτικοί Αλγόριθμοι /Therapeutic algorithms

Ελονοσία

□ Αυτόχθονο κρούσμα

- Φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ιστοσελίδας ΚΕΕΛΠΝΟ
- Συνεχής τροποποίηση σχημάτων ανάλογα με τις διεθνείς οδηγίες
- Χορήγηση πιστοποιητικού θεραπείας σε μετανάστη

Θεραπευτικοί Αλγόριθμοι /Therapeutic algorithms

Ελονοσία

□ Εισαγόμενο κρούσμα σε επιστρέφοντα ταξιδιώτη

- Φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ιστοσελίδας ΚΕΕΛΠΝΟ
- Συνεχής τροποποίηση σχημάτων ανάλογα με τις διεθνείς οδηγίες
- Σε περίπτωση κρούσματος που διαμένει σε περιοχές με παράγοντες κινδύνου για την μετάδοση της ελονοσίας ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού της περιοχής.

Φαρμακευτική αγωγή /Pharmaceutical issues

Ελονοσία

- Πρόταση μελών της ομάδας η απελευθέρωση από το μονοπωλιακό κρατικό καθεστώς των ανθελονοσιακών φαρμάκων και η διακίνηση μέσω φυλασσόμενης συνταγής από όλα τα φαρμακεία της χώρας
 - Έγκριση ανθελονοσιακών φαρμάκων από τον ΕΟΦ
 - Διάθεση μόνο με ιατρική συνταγή από τα φαρμακεία της χώρας
 - Διακίνηση από όλα τα φαρμακεία των Νοσοκομείων της χώρας
- Προσαρμογή του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με ειδοποίηση / ενημέρωση του ΚΕΕΛΠΝΟ και εντοπισμός κρούσματος ελονοσίας

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης, ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας / educational campaign

Level 2, 3

- Ημερίδες ενημέρωσης σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας και των ιδιωτών ιατρών
- Εκπαίδευση RDT και μικροσκοπικής εξέτασης
- Εκπαίδευση εκπαιδευτών με σκοπό την ενημέρωση κάθε ιατρού της προσβεβλημένης περιοχής
- Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων Δημόσιας Υγείας
- Ενημέρωση από το web portal
- Ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

Level 1

- Ημερίδα ενημέρωσης, ανά Περιφερειακή Ενότητα, σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας και των ιδιωτών ιατρών
- Εκπαίδευση RDT και μικροσκοπικής εξέτασης
- Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων Δημόσιας Υγείας
- Ενημέρωση από το web portal
- Ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

Level 0

- Ενημέρωση από το web portal
- Επικοινωνία μέσω επιστολής σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
- Ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

State of the art για τον Ιό του ΔΝ

□ Πηγές που θα χρησιμοποιηθούν

□ Σχεδιασμός "state of the art"

- Βασικές ενότητες
- Πεδία που θα καλύπτονται
 - Χάρτες επιτήρησης
 - Τρόποι διάγνωσης
 - Σημεία αναφοράς για διάγνωση, επιβεβαίωση
 - Τρόποι Θεραπείας, σπάνια φάρμακα
 - Ενημερωτικό υλικό: κοινό / μετανάστες (εικονογραφημένο) / επαγγελματίες υγείας / παιδικός πληθυσμός

Ενίσχυση της επιτήρησης της λοίμωξης από WNV σε ανθρώπους-WNV enhancement of human surveillance

- Υποχρεωτική δήλωση (χρήση υπάρχουσας δήλωσης ΚΕΕΛΠΝΟ)
 - Δήλωση και εργαστηριακός έλεγχος για αρμοπίους κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας.
- Κοινός χάρτης με δεδομένα από ανθρώπους-διαβιβαστές-ιπποειδή-πτηνά
 - Διατομεακή συνεργασία με κτηνιάτρους και εντομολόγους

Παράρτημα 17. Συμπεράσματα από την ομάδα εργασίας 5

Working group 5

Malaria – West Nile Virus

Screening στους μετανάστες για ελονοσία
Οροεπιδημιολογική μελέτη ελονοσίας στη Λακωνία
Ενημέρωση κοινού, μεταναστών για ελονοσία και ιό του ΔΝ

Συντονιστές: Α. Τσακρής
Γ. Δαίκος

Access to health care

- Free access to care re malaria dx & treatment for all migrants (now ONLY in emergencies)
- Free diagnosis & treatment for both *P.vivax* & *P.falciparum*
- Change of law 3385/2006
- Intercultural mediators to facilitate access to care (specific health care points for migrants?)
- Integration of treatment for other communicable diseases

Screening in Evros & other points of entries

- Travel history of all migrants
- Screening with combined RDTs for both symptomatic & all asymptomatic from endemic countries
- All positive to be tested with microscopy & PCR
- Available treatment at detention centre
- Full Treatment for cases in detention centres
- G6PD at hospital or (if not) only chloroquine
- Detailed treatment guidelines depending on country of origin
- Train all medical staff at detention centres and health centres

Population in move in other areas

- Mapping of immigrants in other areas & access in remote places (e.g. mobile clinics)
- Intercultural mediators in local migrant communities-key people
- IEC campaigns in migrant communities re diagnosis & treatment
- Roma community

- 115 -

Mass prophylaxis

- Every week (or every 2 weeks) with chloroquine for all migrants from endemic countries
- Might be an additional measure, but all other measures should be in place
- In areas with at least one locally acquired cases

Mass prophylaxis (disadvantages)

- Not enough evidence & experience
- Problem with adherence
- Possible resistance to chloroquine
- Possible priority in areas where at least one case has been identified

Seroprevalence study of malaria

- To be considered
- Objective to estimate prevalence of anti-malaria antibodies (local community- migrants)
- Investigation of possible risk factors??
- Impact of parasite circulation in local community
- Methodology:
 - Cross-sectional study
 - Cluster sampling (estimating 300 of local community and 600 of migrants) in Evrotas municipality

Questionnaire

- Ethnicity (specific area)
- age
- sex
- Travel history (how many years above?)
- Years in Greece (for migrants)
- Occupation (working hours)
- Protecting measures of mosquito biting

- 116 -

Information-Communication-Education (IEC)

- Use the already existing experience and network
- Appointed representative(s) for media and official communication at central, regional and local level
- Immediate IEC activities in
 - Key societal groups
 - Local indigenous community
 - Migrant and Roma community
 - Health professionals
- Messages
 - Targeted to the group needs (e.g. health, economic impact, access to services, etc)
- Tools
 - Group discussions, meetings, etc
 - Individual approach (pamphlets, flyers, etc)
 - Mass media
- Prompt feedback to relevant authorities

Συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ■ Απόστολος Βεΐζης | ■ Ευθαλία Πίπα |
| ■ Μάριος Δέτσης | ■ Γιώργος Ραχιώτης |
| ■ Κωνσταντίνος Βασάλος | ■ Ειρήνη Τερζάκη |
| ■ Ντάνης Κωνσταντίνος | ■ Ρούσσου Κατερίνα |
| ■ Παπαδοπούλου Αναστασία | ■ Αγγελική Λάμπρου |
| ■ Ευλαμπίδου Ηρώ | ■ Μπορδώκα Αντελίνα |
| ■ Πιπεράκη Ευαγγελία- Θεοφανώ | |
| ■ Ελένη Κάκκαλου | |
| ■ Νίκη Ντάκου | |
| ■ Αγγελική Παπαγιαννοπούλου | |

- 117 -